

”مقارنة طرائق التقدير التقريبية لعلمتي التوزيع اللوجستي“

م. د. عمر عبد المحسن على
جامعة بغداد- كلية الادارة والاقتصاد
قسم الأحصاء

المستخلص

تم إستعراض تقدير معلمتي التوزيع اللوجستي باستعمال طريقة ذات مقدرات مضبوطة وهي طريقة العزوم، ومقارنتها بمقدرات تقريبية مأخوذة بالأساس من أسلوب طريقة (وايت) في التقدير بأعتبر التوزيع اللوجستي من التوزيعات الأحتمالية الأسيّة، وهي كل من طريقة المربعات الصغرى الأعتيادية، وطريقة أنحدار الحرف، وأقتراح تطبيق طريقة أنحدار الحرف المعدلة على هذا التوزيع. وتم استحصل النتائج بالاستناد الى تجارب محاكاة لتلك الطرائق جميعها ولنمذاج مختلفة ولحجوم عينات متنوعة. وتمت المقارنة بالاستناد الى معياري متوسط مربع الخطأ ومتوسط الخطأ النسبي المطلق.

Abstract

The goal beyond this Research is to review methods that used to estimate Logistic distribution parameters. An exact estimators method which is the Moment method, compared with other approximate estimators obtained essentially from White approach such as: OLS, Ridge, and Adjusted Ridge as a suggested one to be applied with this distribution. The Results of all those methods are based on Simulation experiment, with different models and variety of sample sizes. The comparison had been made with respect to two criteria: Mean Square Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

1.1 المقدمة

يعد التوزيع اللوجستي من التوزيعات الحيوية في الأحصاء، وهو توزيع يبرز من توزيعات العائلة الأسيّة، وغالباً ما يستعمل في التطبيقات على منحنى النمو. وهو توزيع شبيه بالتوزيع الطبيعي من ناحية الشكل إلا أنه ذو ذيل أثقل (أي أكثر تفاطحاً). ولذا يمكن تصنيف هذا التوزيع على أنه من التوزيعات ذات (S) - . وتشتهر تطبيقاته في ميادين علوم الحياة **Biology** لوصف حالة نمو مجتمعات الكائنات الحية، وفي علم الأوبئة **Epidemiology** حول إنتشار الأوبئة، وفي البحوث النفسية **Psychology** لوصف قدرات التعلم، وفي التطبيقات التكنولوجية **Technology** لتمثيل إحال تقنية جديدة عوضاً عن أخرى قديمة، وفي التسويق **Marketing** عن كيفية نشر مبيعات منتج معين، وفي التطبيقات الفيزيائية **Physics** كالطاقة **Energy** وعلم السوائل **Hydrology** وفي تطبيقات طبية وزراعية كثيرة ومجالات أخرى عديدة. وأن أول ظهور لهكذا تطبيقات للتوزيع اللوجستي كانت عام 1845 على يد العالم الفرنسي **P.F. Verhulst**. أما تطبيقاته في مجال الاقتصاد والدراسات الديموغرافية فقد بدأت بالظهور مع بدايات القرن التاسع عشر.



2.1 هدف البحث

يهدف البحث الى استعمال طريقة ذات مقدرات مضبوطة Exact - وهي طريقة العزوم- في تقدير معلمتي التوزيع الوجستي، ومقارنتها بمقدرات تقريرية مأخوذة من فكرة طريقة White مثل: المربعات الصغرى وأنحدار الحرف، وأقتراح استعمال طريقة أنحدار الحرف المعدلة للتوزيع الوجستي بسبب ندرة مواضيع التقدير التقريري المستعمل لتقدير معلمات هذا التوزيع (على حد علم الباحث). وتم استعمال القيم المقروءة لكل معلمة على حدة ومتوسط مربع الخطأ لذلك المقدر، بالإضافة الى معيار متوسط الخطأ النسبي المطلق للمقدار نفسه. وللوصول الى هذا الهدف تم تقسيم البحث الى أربعة أجزاء: يبدأ الجزء الأول، المقدمة وهدف البحث. أما في الجزء الثاني، فقد تم عرض مايخص الجانب النظري لطرائق التقدير المستعملة. وفي الجزء الثالث، تم تقديم الجانب التجاريي المستند الى المحاكاة بأربعة نماذج كل منها بثلاث حجوم عينات. وفي الجزء الأخير، تم تلخيص الاستنتاجات التي أفرزها البحث والتوصيات التي خرج بها والبحوث المستقبلية المقترحة ووضع قائمة بالمصادر.

1. الجانب النظري

1.2 التوزيع الوجستي (السوق)

وهو من توزيعات العائلة الأسيّة، وغالباً ما يستعمل في التطبيقات على منحنى النمو ذو علاقة وثيقة بموضوع الأنحدار مع متغير معتمد ثانٍ الاستجابة⁽¹⁾. ومن أهم التوزيعات المأخوذة من هذا التحويل هو التوزيع الوجستي اللوغاريتمي والذي يمكن تطبيقه في مجال دوال البقاء أو دوال المعرفية على حد سواء⁽⁷⁾.

1.1.2 خصائص التوزيع

I. دالة الكثافة الأحتمالية

يعبر عن دالة الكثافة الأحتمالية لهذا التوزيع بالصيغة الآتية⁽⁵⁾:

$$f(t; \mu, \sigma) = \frac{e^{\frac{-(t-\mu)}{\sigma}}}{\sigma \left(1 + e^{\frac{-(t-\mu)}{\sigma}} \right)^2} ; \quad -\infty < t < \infty \quad \dots (1)$$

وأن النمط القياسي لهذا التوزيع يكون عندما: $\text{Logistic}(\mu = 0, \sigma = 1)$ ، وهو مقارب للتوزيع

$$\text{ال الطبيعي } N(0, \frac{\pi^2}{3})$$

Cumulative Distribution function (cdf)

II. دالة التوزيع التراكمية

وتمثل بالصيغة الآتية:

$$F(t; \mu, \sigma) = \frac{1}{1 + e^{\frac{-(t-\mu)}{\sigma}}} ; \quad -\infty < t < \infty \quad \dots (2)$$

$$f(t) = F(t)[1 - F(t)]$$

ويمكن ملاحظة أن:



Moment Generating Function (mgf) ويتم

III. الدالة المولدة للعزوم
التعبير عنها بالصيغة الآتية⁽⁵⁾:

$$M(t) = e^{\mu t} \cdot \Gamma(1 - \sigma t) \cdot \Gamma(1 + \sigma t) \quad \dots (3)$$

أو:

$$M(t) = e^{\mu t} \cdot B(1 - \sigma t, 1 + \sigma t) \quad \text{إذ أن:}$$

$\Gamma(\cdot)$: دالة كاما.
 $B(\cdot, \cdot)$: دالة بيتا.

وعندأخذ المشتقة الأولى بالنسبة لـ t وتعويض $(t = 0)$ يتم الحصول على العزم الأول: $M'(0) = \mu$... (4)

أما العزم الثاني فيتم الحصول عليه منأخذ المشتقة الثانية للصيغة (3) أعلاه بالنسبة لـ t وتعويض $(t=0)$:

$$M''(0) = \mu^2 + \frac{\pi^2 \sigma^2}{3} \quad \dots (5)$$

IV. الوسط والتباين Mean and Variance

من ملاحظة المعادلة (4) أعلاه يتبيّن أن وسط التوزيع هو:

$$E(t) = \mu$$

أما تباين التوزيع فيمكن الحصول عليه بالأستناد إلى المعادلة (4) و (5) أعلاه:

$$\begin{aligned} Var(t) &= E(t^2) - [E(t)]^2 \\ Var(t) &= \frac{\pi^2 \sigma^2}{3} \end{aligned} \quad \dots (6)$$

Estimation Methods

Method of Moments (MOM)

وتستند فكرتها إلى إيجاد عزوم التوزيع للمجتمع أولاً ومن ثم مساواتها بعزوم العينة المنشورة لها، أي القيام بعمل أستدلال يجعل معلمتي التوزيع دالتين (إحصائيتين) من مشاهدات العينة، وكما في أدناه.

فالعزم الأول ما هو إلاّ عبارة عن:

$$M_1 = E(t) = \mu$$

$$m_1 = \bar{t}$$

$$\hat{\mu} = \bar{t}$$

... (7)

أما العزم الثاني فهو:

$$M_2 = Var(t) + M_1^2$$

$$m_2 = \frac{\sum_{i=1}^n t_i^2}{n}$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\sqrt{3}}{\pi} S_d \quad \dots (8)$$

2.2 طرائق التقدير 1.2.2 طريقة العزوم⁽⁶⁾



إذ أن:

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n t_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} \right)^2}$$

2.2.2 طريقة المرءات الصغرى الأعتيادية Ordinary Least Squares (OLS)
 وهي طريقة تحول العلاقة بين متغير الظاهره والدالة التجمعيه (cdf) – دالة الامولية
 (أو يمكن استعمالها مع دالة المولية) لها الى علاقة تصاغ كأنحدار خطى بسيط^{(3),(2)}.
 فبافتراض الدالة التوزيعية لمتغير t يتبع التوزيع اللوجستي:

$$F(t) = \frac{1}{1 + e^{\frac{-(t-\mu)}{\sigma}}}$$

وليكن: $u = F(t)$

$$u = \frac{1}{1 + e^{\frac{-(t-\mu)}{\sigma}}}$$

ل يتم الحصول على:

$$e^{\frac{-(t-\mu)}{\sigma}} = u^{-1} - 1$$

وبأخذ لوغاريتم الطبيعي (ln) لطرف المعادلة أعلاه نحصل على:

$$-\frac{t-\mu}{\sigma} = \ln(u^{-1} - 1)$$

$$\ln(u_i^{-1} - 1) = \frac{\mu}{\sigma} - \frac{1}{\sigma} t_i \quad \dots (9)$$

وبالنظر الى الصيغة (9) أعلاه كنموذج أنحدار خطى بسيط،

$$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad \dots (10)$$

إذ أن: b_0 و b_1 هما معلمتي نموذج الأنحدار، وأن: e_i هي الأخطاء العشوائية لـ n من المشاهدات.
 وعند أخذ التعويض بنظر الاعتبار يتم الحصول على:

$$X_i = t_i$$

$$b_0 = \frac{\mu}{\sigma}$$

$$b_1 = \frac{-1}{\sigma} \quad \dots (11)$$

$$Y_i = \ln(u^{-1} - 1)$$



والغرض من هذا كله هو أجراء تقدير معلمات الصيغة (10) أعلاه، وكما يأتي:

$$\hat{Y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_i \quad \dots (12)$$

أن أساس طريقة المربعات الصغرى هو السعي إلى تصغير مجموع مربعات الخط^{(2),(3)}:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2 \quad \dots (13)$$

وذلك بأخذ المشتقة الجزئية للصيغة (13) بالنسبة للمعلمتين b_0 و b_1 ومساواتها بالصفر للحصول على القيم التقديرية لها \hat{b}_0 و \hat{b}_1 بصيغة المصفوفات:

$$\hat{\underline{b}}_{(ols)} = \begin{bmatrix} \hat{b}_0 \\ \hat{b}_1 \end{bmatrix} = (X'X)^{-1} X'Y \quad \dots (14)$$

ف تكون تقديرات معلمتي النموذج اللوجستي الأحتمالي بدلالة مقدرات طريقة OLS لمعلمتي الأندار الخطى كالآتى:

$$\hat{\mu}_{(OLS)} = \frac{-\hat{b}_0(OLS)}{\hat{b}_1(OLS)} \quad \dots (15)$$

$$\hat{\sigma}_{(OLS)} = \frac{-1}{\hat{b}_1(OLS)} \quad \dots (16)$$

3.2.2 طريقة إندار الحرف Ridge Regression Method

وهي من الطرائق التي تعول على إيجاد مقدرات الأندار بالاستناد إلى مصفوفة المعلومات X' و X وكما يأتي⁽⁴⁾:

$$\hat{\underline{b}}_{(Rig)} = \begin{bmatrix} \hat{b}_0 \\ \hat{b}_1 \end{bmatrix} = (X'X + kI)^{-1} X'Y \quad \dots (17)$$

إذ أن: $k < 1$ تمثل معامل الحرف Coefficient of Ridge

وأن: I هي مصفوفة وحيدة Identity بأبعاد $p \times p$

وأن: p هو عدد المعلمات في نموذج الأندار وهي هنا ($p = 2$). (p = 2).

وتم الاستناد إلى الأسلوب الشخصي (Subjective Technique) في هذا البحث لاختيار قيمة k وهي بأن يتم تحديدها بشكل مسبق في الحل ولقد اختار الباحث قيمة ($k=0.5$). وهو أسلوب يختلف عن الأسلوب الآلي (Automatic Technique) بأن يجعل تحديد k المثلث يكون بشكل آلي من ضمن العديد من قيم k 's المرشحة بأسعمال معيار معين. وستكون تقديرات معلمتي النموذج اللوجستي الأحتمالي

$\left(\hat{\mu}_{(Ridg.)}, \hat{\sigma}_{(Ridg.)} \right)$ بدلالة مقدرات طريقة Ridge لمعلمتي الأندار الخطى بمثيل ماجاء في المعادلتين

(15) و (16) مع استبدال مقدرات طريقة OLS لمعلمتي الأندار (b_0, b_1) بمقدرات طريقة Ridge.



4.2.2 طريقة أنحدار الحرف المعدلة Adjusted Ridge Regression method

تم استعمال هذه الطريقة مع توزيعات أخرى غير التوزيع اللوجستي سابقاً في مواضع دالة المعلمية (أو دالة البقاء)، إلا أن الباحث اقترح هنا استعمالها مع التوزيع اللوجستي. وهي طريقة شبيهة بطريقة أنحدار الحرف إلا أن اختيار قيمة k_{adj} ستبدل بأخرى يعتقد أنها تؤثر في كفاءة تدبير معلمتي نموذج الأنحدار b_0 و b_1 والتي يتم الحصول على تدبيراتها من خلال الآتي:

$$\hat{b}_{(ARig.)} = \begin{bmatrix} \hat{b}_0 \\ \hat{b}_1 \end{bmatrix} = \left(X'X + k_{adj} I \right)^{-1} X'Y \quad \dots (18)$$

أذ أن: k_{adj} يتم أيجادها بالصيغة الآتية:

$$k_{adj} = \frac{pS_{OLS}}{\hat{b}'_{OLS} \hat{b}_{OLS}} \quad \dots (19)$$

وأن:

$$S_{ols} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{b}_0 - \hat{b}_1 X_i)^2}{n - p} \quad \dots (20)$$

وستكون تدبيرات معلمتي النموذج اللوجستي الأحتمالي $(\hat{\mu}_{(ARidg.)}, \hat{\sigma}_{(ARidg.)})$ بدلالة مقدرات طريقة ARidge لمعلمتي الأنحدار الخطى بمثل ما جاء في المعادلتين (15) و (16) مع استبدال مقدرات طريقة OLS لمعلمتي الأنحدار (b_0, b_1) بمقدرات طريقة ARidge.

3. الجانب التجربى

1.3 المحاكاة

تم إعداد برنامجاً خاصاً باستعمال لغة MATLAB version 8.0 (Release 14) البرمجية في إجراء تجربة جارب المحاكاة بمراحلها من توليد البيانات إلى استخراج المقدرات وأخيراً استخراج قيم معايير المفاضلة بين الطرائق. أذ تم إعادة التجريب لـ ($rep = 1000$) تكرار، وبحجم عينات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ($n = 15, 30, 100$) وللنماذج الآتية:

.النموذج الأول: ($\mu=1.0, \sigma=0.5$).

.النموذج الثاني: ($\mu=1.0, \sigma=1.0$).

.النموذج الثالث: ($\mu=1.0, \sigma=1.5$).

.النموذج الرابع: ($\mu=1.0, \sigma=2.0$).

ويتم توليد بيانات التوزيع اللوجستي كما يأتي:

$$t_i = \mu - \sigma \ln(u_i^{-1} - 1) \quad \dots (21)$$

أذ أن: u_i متغير عشوائي يتبع التوزيع المنتظم القياسي،
أي أن: $u_i \sim \text{Standard Uniform}(0, 1)$



2.3 معايير المقارنة

1.2.3 متوسط مربعات الخطأ

Mean Squared Error (MSE)

ويمثل معيار مقارنة تكون فيه الأفضلية لقيمة الأصغر الأقرب إلى الصفر، وكما في الصيغة:

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^{rep} \left\{ \theta_i - \hat{\theta}_i \right\}^2}{rep} \quad \dots (22)$$

2.2.3 متوسط الخطأ النسبي المطلق (MAPE)

ويمثل معيار مقارنة تكون فيه الأفضلية لقيمة الأصغر الأقرب إلى الصفر، وكما في الصيغة:

$$MAPE = \frac{\sum_{i=1}^{rep} |\theta_i - \hat{\theta}_i|}{rep} \quad \dots (23)$$

وللمعيارين أعلاه، فإن θ : هي أحدى معلمتي التوزيع (μ, σ).
وأن rep: هو عدد التكرارات في تجربة المحاكاة.

3.3 النتائج

تم الحصول على نتائج تدبير معلمتي التوزيع الوجستي وللنماذج وجحوم العينات المستعملة مع معياري المقارنة MSE و MAPE وكما في الجداول أدناه.

جدول (1) تدبيرات معلمة الموقف μ

| Model | Sample size | Method | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | MOM | OLS | Ridg. | ARidg. |
| I | 15 | 1.0059 | 1.0031 | 0.9684 | 0.9836 |
| | 30 | 1.0056 | 1.0004 | 0.9834 | 0.9912 |
| | 100 | 1.0010 | 0.9992 | 0.9967 | 1.0017 |
| II | 15 | 1.0118 | 0.9383 | 0.9717 | 1.0063 |
| | 30 | 1.0113 | 0.9663 | 0.9839 | 1.0008 |
| | 100 | 1.0012 | 0.9933 | 0.9985 | 1.0035 |
| III | 15 | 1.0177 | 0.8815 | 0.9749 | 1.0094 |
| | 30 | 1.016 | 0.9300 | 0.9843 | 1.0012 |
| | 100 | 1.0031 | 0.9829 | 1.0002 | 1.0053 |
| IV | 15 | 1.0236 | 0.8264 | 0.9781 | 1.0126 |
| | 30 | 1.0226 | 0.8882 | 0.9848 | 1.0017 |
| | 100 | 1.0041 | 0.9684 | 1.0020 | 1.0070 |



جدول (2) متوسط مربعات الخطأ MSE لنقديرات معلمة الموضع μ

| Model | Sample size | Method | | | | Best |
|-------|-------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| | | MOM | OLS | Ridg. | ARidg. | |
| I | 15 | 0.05901 | 0.02014 | 0.025017 | 0.02413 | OLS |
| | 30 | 0.02784 | 0.00977 | 0.01070 | 0.0104 | OLS |
| | 100 | 0.0085 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0026 | OLS |
| II | 15 | 0.2360 | 0.09312 | 0.08056 | 0.08019 | ARidg. |
| | 30 | 0.1113 | 0.04235 | 0.03908 | 0.03894 | ARidg. |
| | 100 | 0.0342 | 0.01083 | 0.01065 | 0.01061 | ARidg. |
| III | 15 | 0.5311 | 0.1939 | 0.1812 | 0.1733 | ARidg. |
| | 30 | 0.2506 | 0.0950 | 0.0879 | 0.0861 | ARidg. |
| | 100 | 0.0771 | 0.0245 | 0.0237 | 0.0239 | ARidg. |
| IV | 15 | 0.9443 | 0.3222 | 0.3114 | 0.3040 | ARidg. |
| | 30 | 0.4455 | 0.1563 | 0.1648 | 0.1521 | ARidg. |
| | 100 | 0.1371 | 0.0426 | 0.0422 | 0.0438 | Ridg. |

جدول (3) متوسط الخطأ النسبي المطلق MAPE لنقديرات معلمة الموضع μ

| Model | Sample size | Method | | | | Best |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | MOM | OLS | Ridg. | ARidg. | |
| I | 15 | 0.1380 | 0.1197 | 0.1232 | 0.1116 | ARidg. |
| | 30 | 0.1099 | 0.0773 | 0.0812 | 0.0800 | OLS |
| | 100 | 0.0501 | 0.0415 | 0.0416 | 0.0412 | ARidg. |
| II | 15 | 0.2444 | 0.2379 | 0.2219 | 0.2232 | Ridg. |
| | 30 | 0.1852 | 0.1546 | 0.1546 | 0.1615 | OLS |
| | 100 | 0.0811 | 0.0832 | 0.0823 | 0.0824 | MOM |
| III | 15 | 0.3611 | 0.3494 | 0.3270 | 0.3349 | Ridg. |
| | 30 | 0.2700 | 0.2437 | 0.2298 | 0.2320 | Ridg. |
| | 100 | 0.1389 | 0.1253 | 0.1232 | 0.1237 | Ridg. |
| IV | 15 | 0.4923 | 0.4500 | 0.4465 | 0.4334 | ARidg. |
| | 30 | 0.3333 | 0.3054 | 0.3241 | 0.3093 | OLS |
| | 100 | 0.1742 | 0.1679 | 0.1649 | 0.1642 | ARidg. |

يلاحظ من نتائج الجدول (2) أعلاه تفوق طريقة OLS على باقي الطرائق لنتائج النموذج الأول ولجميع حجوم العينات. فيما كانت طريقة ARidg. هي الأفضل في النماذج الثلاث الأخرى فيما عدا حالة حجم العينة الكبير ($n=100$) أذ كانت الأفضل في النموذج الرابع هي طريقة Ridg.. أما نتائج الجدول (3) أعلاه فتشير إلى تفوق طريقة OLS على باقي الطرائق لنتائج جميع النماذج ولحجم عينة ($n=30$) فقط. فيما كانت طريقة Ridg. هي الأفضل للنموذج الثالث ولجميع حجوم العينات.



جدول (4) تقدیرات معلمة القياس σ

| Model | Sample size | Method | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | MOM | OLS | Ridg. | ARidg. |
| I | 15 | 0.4737 | 0.5427 | 0.5653 | 0.5111 |
| | 30 | 0.4887 | 0.5177 | 0.5282 | 0.5052 |
| | 100 | 0.4964 | 0.5050 | 0.5081 | 0.5018 |
| II | 15 | 0.9475 | 1.0818 | 1.0494 | 1.0223 |
| | 30 | 1.0104 | 0.9775 | 1.0219 | 1.0351 |
| | 100 | 0.9928 | 1.0100 | 1.0067 | 1.0036 |
| III | 15 | 1.4212 | 1.6155 | 1.5514 | 1.5334 |
| | 30 | 1.4662 | 1.5516 | 1.5233 | 1.5156 |
| | 100 | 1.4893 | 1.5150 | 1.5075 | 1.5054 |
| IV | 15 | 1.8950 | 2.1443 | 2.0580 | 2.0446 |
| | 30 | 1.9550 | 2.0668 | 2.0266 | 2.0208 |
| | 100 | 1.9857 | 2.0072 | 2.0199 | 2.0080 |

جدول (5) متوسط مربعات الخطأ MSE لنقدیرات معلمة القياس σ

| Model | Sample size | Method | | | | Best |
|-------|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | | MOM | OLS | Ridg. | ARidg. | |
| I | 15 | 0.0133 | 0.0160 | 0.0159 | 0.0086 | ARidg. |
| | 30 | 0.0062 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0034 | ARidg. |
| | 100 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | ARidg. |
| II | 15 | 0.0535 | 0.0601 | 0.0385 | 0.0344 | ARidg. |
| | 30 | 0.0248 | 0.0141 | 0.0146 | 0.0138 | ARidg. |
| | 100 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0031 | MOM |
| III | 15 | 0.1204 | 0.1257 | 0.07743 | 0.0806 | Ridg. |
| | 30 | 0.0558 | 0.0400 | 0.0310 | 0.0318 | Ridg. |
| | 100 | 0.0180 | 0.0075 | 0.0070 | 0.0071 | Ridg. |
| IV | 15 | 0.21409 | 0.2097 | 0.1401 | 0.1376 | ARidg. |
| | 30 | 0.09923 | 0.0698 | 0.0559 | 0.0552 | ARidg. |
| | 100 | 0.03212 | 0.0126 | 0.0134 | 0.0130 | OLS |



جدول (6) متوسط الخطأ النسبي المطلق MAPE لتقديرات معلمة القياس ٥

| Model | Sample size | Method | | | | Best |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | MOM | OLS | Ridg. | ARidg. | |
| I | 15 | 0.1898 | 0.1673 | 0.1747 | 0.1354 | ARidg. |
| | 30 | 0.1023 | 0.0958 | 0.0986 | 0.0871 | ARidg. |
| | 100 | 0.4800 | 0.0464 | 0.0470 | 0.0451 | ARidg. |
| II | 15 | 0.1505 | 0.1644 | 0.1403 | 0.1354 | ARidg. |
| | 30 | 0.0997 | 0.0956 | 0.0885 | 0.0871 | ARidg. |
| | 100 | 0.4498 | 0.0464 | 0.0454 | 0.0451 | MOM |
| III | 15 | 0.1411 | 0.1606 | 0.1354 | 0.1368 | Ridg. |
| | 30 | 0.1064 | 0.0953 | 0.0871 | 0.0876 | Ridg. |
| | 100 | 0.4676 | 0.0463 | 0.0451 | 0.0452 | Ridg. |
| IV | 15 | 0.1613 | 0.1570 | 0.1359 | 0.1354 | ARidg. |
| | 30 | 0.0987 | 0.0948 | 0.0874 | 0.0871 | ARidg. |
| | 100 | 0.0513 | 0.0450 | 0.0451 | 0.0463 | OLS |

أفرزت نتائج الجدولين (5) و (6) أفضلية واضحة لطريقة ARidg. على ماسواها من الطرائق، فيما عدا حالة النموذج الثاني وبحجم عينة ($n=100$) إذ كانت MOM هي الأفضل، وحالة النموذج الرابع وبحجم عينة ($n=100$) كذلك فقد تفوقت طريقة OLS. أما نتائج النموذج الثالث فقد كانت الأفضلية لطريقة Ridg.

4. الاستنتاجات والتوصيات

1.4 الاستنتاجات

- أ. أن طريقة ARidg. كانت لها الأفضلية على طرائق التقدير الأخرى ولجميع حجوم العينات ولجميع النماذج. وذلك لأنها معلومات إلى مصفوفة $X^T X$ عن طريق المعامل k_{adj} .
- ب. تقارب طريقيتي OLS و Ridg. في حالة حجوم العينات الصغيرة والمتوسطة في حين يظهر تفاوت بينهما في حالة العينات الكبيرة بتفوق طريقة OLS.
- ج. تناقص قيم معياري المقارنة MSE مع MAPE مع زيادة حجم العينة ولجميع النماذج ولجميع الطرائق.
- د. أظهرت نتائج النموذج الرابع عموماً أفضلية على النماذج الأخرى.

2.4 التوصيات

يوصي الباحث باستعمال طريقة ARidg. لما لها من كفاءة عالية متأتية من المعلومات الأضافية التي تزودنا بها هذا الطريقة عن التوزيع تحت الدرس مقارنة بالطرائق الأخرى.

3.4 الدراسات المستقبلية

- أ. ينصح الباحث بمحاولة العمل المستقبلي في أحد المواضيع المتعلقة بهذا البحث، وهي كما يأتي: أ. استعمال معيار آلي Automatic k لأيجاد قيمة k يتم فيه اختيار القيمة المثلث وفق معيار معين من بين قيم عديدة مرشحة من k 's، أو عن طريق دالة لامعلمية معينة كأن تكون الدالة اللبية لكونها تقع بين الصفر والواحد.
- ب. إجراء تقدير معمولة التوزيع اللوجستي أي تقدير دالة $R(t)$.
- ج. استعمال الأسلوب البيزي، أو طريقة المربعات الصغرى التكرارية الموزونة في التقدير.
- د. استعمال المقاييس التجزئية Quantiles في عملية التقدير.



References

المصادر

1. Augustin, Thomas; (2005); “An Approach to Combine the Logistic Threshold Model of Psychophysics with Bradley – Terry – Luce Models of Choice Theory”; *Journal of Mathematical Psychology* Vol. 49, pp. 70–79.
2. Bickel, P.J. and Doksum, K.A.; (1977); “Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics”; Holden-Day, Inc., San Francisco.
3. Feras, S.M. and Sharad, D.G.; (2009); “Ridge Regression Estimator: Combining Unbiased Ridge Regression Methods of Estimation”; *Surveys in Mathematics an its Applications*; Vol.
4. Ebeling, C.E.; (1997); “An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering”; McGraw – Hill companies, New-York.
5. Johnson, Norman L. and Samuel Kotz; (1970); “Continuous Univariate Distributions - 2”; New York: Houghton Mifflin.
6. Mahdi, Smail and Cenac, Myrtene; (2006); “Estimating and Assessing the Parameters of the Logistic and Rayleigh Distributions from Three Methods of Estimation”; *Caribb J. Math. Comput. Sci.*; Vol. 13, pp. 25 – 34.
7. Rao, G. S.; Kantam, R.; (2010); “Estimation of Reliability in Multicomponent Stressstrength Model: Log-Logistic Distribution”; *Journal of Applied Statistical Analysis*, Vol. 3, No.2, pp. (75 – 84).