

دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

م. د. جنان عباس ناصر
معهد الادارة / الرصافة

Comparison study of Information Criteria to determine the order of Autoregressive models

Abstract

In this study, we compare between the traditional Information Criteria (AIC, SIC, HQ, FPE) with The Modified Divergence Information Criterion (MDIC) which used to determine the order of Autoregressive model (AR) for the data generating process, by using the simulation by generating data from several of Autoregressive models, when the error term is normally distributed with different values for its parameters (the mean and the variance),and for different sample sizes.

الخلاصة

بهذا البحث نقارن معايير المعلومات التقليدية (AIC ، SIC ، HQ ، FPE) مع معايير معلومات الانحراف المحوّر (MDIC) المستعملة لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي (AR) للعملية التي تولد البيانات، باستعمال المحاكاة وذلك بتوليد بيانات من عدة نماذج لأنحدار الذاتي، عندما خضوع حد الخطأ للتوزيع الطبيعي بقيم مختلفة لمعلماته (المتوسط والتباين) ولحجوم مختلفة من العينات.



1. المقدمة

في اغلب الدراسات الاقتصادية تكون البيانات فيها عبارة عن سلسلة زمنية { x_t } ، وغالباً ما يستعمل نموذج الانحدار الذاتي (AR) لنجدت مثل هذا النوع من السلسلات الزمنية. وتعد مسألة اختيار رتبة نموذج AR من أحد المشاكل التي تواجه الباحث عند نجدت السلسلة الزمنية، لتحديد الرتبة p وبالتالي تحديد الأنماذج باقل عدد من المعلومات للعملية التي تولد البيانات. ولذا طورت عدة اساليب لتقدير طول الانزاحة (او نقدير الرتبة) الملائمة لأنماذج الانحدار الذاتي، منها الطرق البيانية متمثلة بطريقة Box & Jenkins عام 1970 والتي تعتمد على رسم قيم دالة الارتباط الذاتي (ACF) مقابل الازاحة k ، ورسم قيم دالة الارتباط الذاتي الجزئية (PACF) مقابل الازاحة k لتحديد رتبة الأنماذج.

ثم استخدمت معايير المعلمات لتقدير طول الانزاحة (او نقدير الرتبة) لأنماذج الانحدار الذاتي مثل معيار معلومات Akaike عام (1973) الذي يعد مساهمة معنوية في النجدجة الاصحائية لأنماذج AR(p)، ومعيار معلومات Schwarz عام (1978)، ومعيار معلومات Hannan-Quinn عام (1979)، ومعيار خطأ التنبؤ النهائي المقترن من قبل Akaike عام (1979). اذ يتم تقدير معلمات الأنماذج AR(p) بعدة قيم مقترنة للرتبة p ، ثم حساب كل قيمة كل معيار من المعايير المتقدم ذكرها عند تلك الرتب المقترن استخدامها في المقارنة، ومن ثم تحديد الرتبة الملائمة لأنماذج والتي تناظر اقل قيمة من تلك القيم وكل معيار من المعايير المتقدم ذكرها.

وقدم مؤخراً معيار جديد لأختيار رتبة نماذج الانحدار الذاتي (AR(p)) وهو معيار معلومات الانحراف (DIC(P)) (The Divergence Information criterion(DIC(P))) Mattheou [9,3]، واستعمل الباحثان Karagrigoriou [5,4] في عام 2008 معيار معلومات الانحراف المحور ((MDIC(α)) لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي للعملية التي تولد البيانات، مقارنة بمعايير المعلمات التقليدية المتقدم ذكرها. وفي هذا البحث تجري عن فاعلية معيار معلومات الانحراف المحور ((MDIC(α))) المعتمد على قيمة α التي تكون قيمتها $1 < \alpha < 0$ ، ونكشف امكانياته في تحديد رتبة نماذج AR(p) باستخدام المحاكاة مقارنة بمعايير المعلمات التقليدية (FPE ، HQ ، SIC ، AIC) لسلسلة زمنية مولدة من اربعة نماذج لأنحدار الذاتي، عند خضوع متغير حد الخطأ للتوزيع الطبيعي بقيم مختلفة لمعلماته ولحجوم مختلفة من العينات.

2. الخلفية التاريخية

لقد تناول عدد غير قليل من الباحثين دراسة معايير المعلمات التقليدية ومعايير معلومات الانحراف المقترن مؤخراً والمقارنة فيما بينها، وفيما يلي خلاصة موجزة لبعض ماقتب حول تلك المعايير.

في عام 1996 تناول الباحثان Kitagawa و Konishi [7] في بحثهما معايير المعلمات المعممه لاختيار رتبة الأنماذج، بتقدير مقياس Kullback-Leibler عندما يكون التقدير غير معتمد على مقدر الامكان الاعظم، وطبقاً لمعايير المعلمات المقترنة في بحثهما لتقييم النماذج المقترنة بطريقة الامكان الاعظم واساليب بيز، وقد ناقشا استعمال الدالة bootstrap باستعمال المحاكاة.

في عام 1998 طور الباحثون Basu و Harris و Jone و Hjort [1] طريقة تقدير ادنى انحراف لتقدير رصين للمعلومة. اذ تم التقدير بالاعتماد على دالة كثافة جديدة معتمدة على الانحرافات. وقد سمى هذا المقياس بـ BHHJ الذي يقترن بالمعلومة الموجبة $1 < \alpha < 0$ ، التي تعد عامل للموازنة بين رصانة التقدير وكفانته، ويعتمد مقياس BHHJ على قوة الانحراف بين الأنماذج المرشح استخدامه والأنماذج الحقيقي الذي يكون عادة مجهول. وتعد هذه الطريقة امتداد رصين لتقدير الامكان الاعظم بـ $\alpha = 0$. ويكون التقدير اكثراً رصانة كلما اقترب قيمة α من الصفر.

في عام 1999 ناقش الباحثان Vonta و Karagrigoriou [2] مفهوم اختيار كفوء للرتبة بصورة محاذية للتنبؤ بالخطوة h بالاعتماد على معيار Akaike ، لتحديد رتبة الانحدار الذاتي ذات رتبة محددة بمتوسط غير صافي لعملية الانحدار الذاتي، عندما يمثل حد خطأ سلسلة من المتغيرات العشوائية المستقلة والمتطبقة للتوزيع (iid) بمتوسط صفر وتبالين مقداره s^2 . فضلاً عن استعمال معيار خطأ التنبؤ النهائي (FPE)، وقد اشتق الباحثان صيغة لمتوسط مربعات الخطأ (MSE) للتنبؤ بالخطوة h بحد ادنى لـ MSE، باستعمال معيار Shibata.



في عام 2004 استعمل الباحث Liew [8] معايير المعلمات (BIC ، FPE ، HQ ، SIC، AIC)، لتقدير طول الإزاحة لعملية الانحدار الذاتي. إذ تم حساب احتمالات تقدير الرتبة الفعلية للأنموذج الذي ولدت منه البيانات فضلاً عن تقدير احتمالات تقدير رتبة تكون أقل / أكبر من الرتبة الفعلية للأنموذج الذي ولدت منه البيانات. وذلك من خلال توليد بيانات من أنموذج AR(4) المستقر عند خصوص معلمات الأنموذج AR(4) للتوزيع المنظم بالفترة من 1-30 لضمان شرط الاستقرارية لتلك العملية، وخصوص متغير حد الخطأ للتوزيع الطبيعي بمتوسط صفر وتبين مقداره σ^2 بحجم العينة S30 ومن ثم بحذف أول 2S لأستبعد تأثير القيم الأولية عند توليد السلسلة الزمنية. وقد توصل إلى أن المعيارين AIC و FPE يكون لهما أداء متميز في حالة الحجوم الصغيرة من العينات لتقدير طول الإزاحة الفعلية لعملية الانحدار الذاتي.

في عام 2006 درس الباحثان Juarez [9] و Schucany [9] السلوك المحاذى لـ The Minimum Density Power Divergence Estimator (MDPDE) بوضع شروط جديدة لتحليل السلوك المحاذى لـ MDPDE ، وتوصلوا إلى نتائج مهمة تعطي الاتساق والطبيعة المحاذية لـ MDPDE .

في عام 2007 ناقش الباحثان Mattheou و Karagrigoriou [5] خصائص مقياس معلمات الانحراف المقدم مؤخراً والمسمى بمقاييس BHHJ في حالة الصيغة المتقطعة لدالة الكثافة بالارتباط مع اختبارات حسن المطابقة. وقد استعملوا المحاكاة لفحص تناسب احصاء الاختبار المقترنة.

في عام 2008 ناقش الباحثان Papaioannou و Karagrigoriou [3] في بحثهما المنشور على الانترنت ثلاثة أنواع من المقايس، وهي مقياس Fisher ومقياس الانحراف (divergence) ومقياس entropy مع دراسة خصائصها. وعرضت المعلمات اعتماداً على بيانات مراقبة وبيانات مبتورة، وتم التحري عن معايير اختيار الأنموذج باستعمال معيار أكيري (AIC) ومعيار معلمات الانحراف (DIC).

في عام 2008 قارن الباحثون Mattheou و Karagrigoriou [4] في بحثهم المنشور على الانترنت بين معايير اختيار رتبة الأنموذج (BHHJ) و معيار معلمات الانحراف المحور (MDIC)(α))، المعتمد على مقياس BHHJ للأنحراف بين الأنموذج المرشح (f_0) والأنموذج الحقيقي (g)، إذ يعرف مقياس BHHJ بالصيغة الآتية:

$$I^\alpha(g, f_\theta) = \int \left\{ f_\theta^{1+\alpha}(z) - \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) g(z) f_\theta^\alpha(z) + \left(\frac{1}{\alpha}\right) g_\theta^{1+\alpha}(z) \right\} dz.$$

ويعتمد مقياس BHHJ على المعلمة α التي تكون قيمتها $1 < \alpha < 0$ ، التي تستعمل للموازنة بين الرصانة وكفاءة مقدرات المعلمة، ويتحول مقياس BHHJ إلى مقياس الانحراف لـ Kullback-Leiber وعندما تكون قيمة $\alpha = 0$ ، أما عندما تكون قيمة $\alpha = 1$ فان هذا المقياس يكون عبارة عن مربع المسافة القياسية L_2 بين الأنموذج المرشح والأنموذج الحقيقي. وقد استعملوا المحاكاة لتوليد بيانات من ستة نماذج للانحدار الذاتي، عند خصوص حد الخطأ للتوزيع الطبيعي بمتوسط صفر وتبين مقداره واحد، وقد توصلوا إلى ان اداء معيار معلمات الانحراف يكون منفوق على اداء بقية المعايير التقليدية من خلال معدلات النجاح المحسوبة (تقدير الرتبة المطابقة للأنموذج الذي ولدت منه البيانات) لكل انموذج وكل معيار من المعايير المعتمدة في المقارنة .

3. نماذج الانحدار الذاتي (AR(P))

يشار لعملية الانحدار الذاتي بطول ازاحة P بـ AR(P)، وتعتمد قيمتها الحالية x_t على اول P من القيم المتباطئة زمنيا $(x_{t-P}, x_{t-1}, x_{t-2}, x_{t-3}, \dots)$. ويمكن تعريف عملية الانحدار الذاتي من الرتبة P للسلسلة الزمنية $\{x_t\}$ عندما تكون $n = 1, 2, \dots, t$ وفق الصيغة الآتية [4, 8]:

$$x_t = \phi_1 x_{t-1} + \phi_2 x_{t-2} + \dots + \phi_p x_{t-p} + e_t \quad \dots \quad (1)$$



عندما تكون $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p)$ معلمات عملية / انموذج الانحدار الذاتي. وان e_t تمثل حد الخطأ وهو عبارة عن سلسلة من المتغيرات العشوائية المستقلة والمتطابقة التوزيع (iid) بمتوسط صفر وتباین مقداره σ^2 . وان كل جذور متعددة حدود الانحدار الذاتي تقع خارج دائرة الوحدة اي ان

$$A(B) = 1 - \varphi_1 B - \varphi_2 B^2 - \dots - \varphi_p B^p \neq 0, \quad |B| < 1$$

وان B^j تمثل معامل الارتداد الخلفي اي ان $x_t^j = x_{t-j}$

وقد استخدمت طريقة تقدير اقل المربعات (Least Squares) لتقدير معلمات الانموذج . وتعد هذه الطريقة من اكثرا الاساليب الشائعة الاستخدام ، ولتقدير الصيغة (1) يتم تصغير مجموع مربعات الخطأ

$$\left(\sum_{t=1}^n e_t^2 \right) \text{ عندما تكون } (\hat{x}_t - \hat{x}_{t-p})^2 \text{ و هي مساوية}$$

لـ $\hat{x}_t = - \sum_{j=1}^p \varphi_j \hat{x}_{t-j}$ حيث يتم تصغير خطأ التنبؤ الامامي بمعنى اقل المربعات. وهذا مطابق لحل المعادلات الطبيعية وفق الاتي [10] :

$$M_p \varphi_p = -m_p \quad \dots (2)$$

حيث ان M_p تعرف بالصيغة

$$\cdot \begin{pmatrix} x_{t-1} \\ \cdot \\ (x_{t-1}, \dots, x_{t-p}) \\ x_{t-p} \end{pmatrix}$$

$$M_p = \sum_{t=p+1}^n x_t$$

$$\cdot \begin{pmatrix} x_{t-1} \\ \cdot \\ x_{t-p} \end{pmatrix} \quad \text{وان } m_p = \sum_{t=p+1}^n x_t$$

وان تقدير اقل المربعات للتباین σ^2 سيكون وفق الصيغة الآتية

$$\sigma^2 = (n-p)^{-1} \sum_{t=p+1}^n (x_t - \hat{x}_t)^2 \quad \dots (3)$$



4. معايير المعلومات

في هذا المبحث تبين معايير المعلومات المستخدمة للمقارنة فيما بينها لغرض تحديد رتبة نموذج الانحدار الذاتي الذي ولدته منه البيانات [4,8]. إذ يتم اختيار رتبة نموذج الانحدار الذاتي وفقاً لأصغر قيمة من بين المعايير المستخدمة في المقارنة.

• معيار المعلومات Akaike (Akaike 1973)

$$AIC(P) = \log(\sigma^2_P) + (2p/n) \quad \dots (4)$$

• معيار معلومات Schwarz (Schwarz 1978)

$$SIC(P) = n \log(\sigma^2_P) + p \log(n) \quad \dots (5)$$

• معيار معلومات Hannan & Quinn (Hannan & Quinn 1979)

$$HQ(P) = n \log(\sigma^2_P) + c \log \log(n) \quad \text{For } c > 2 \quad \dots (6)$$

وقد استخدمت القيمة $c=3$ لحساب هذا المعيار.

• معيار خطأ التنبؤ النهائي (Akaike 1979)

$$((n+p)/(n-P)) \sigma^2_P FPE(P) = \dots (7)$$

أذ ان P تمثل عدد المعلومات المقدرة في نموذج الانحدار الذاتي، و n تمثل حجم العينة و σ^2_P تمثل التباين المقدر من بوافي الأنماذج.

• معيار معلومات الانحراف المحور (The Modified Divergence Information Criterion)

(Mantalos & Mattheou & Karagrigoriou 2008)

يعرف معيار معلومات الانحراف المحور (MDIC) لمجموعة من المشاهدات (X_1, X_2, \dots, X_n) بالصيغة الآتية :

$$MDIC(p) = n * MQ_{\hat{\theta}} + (2\pi)^{-a/2} (1+a)^{2+p/2} p \quad \dots (8)$$

عندما تكون

$$MQ_{\hat{\theta}} = - \left[(1 + \alpha^{-1}) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_{\hat{\theta}}^{\alpha}(x_i) \right] \quad \dots (9)$$

وان

$$f_{\hat{\theta}}(x_i) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi\hat{\sigma}^2)}} \exp \left\{ -\frac{\hat{e}^2}{2\hat{\sigma}^2} \right\}$$

...(10)

عندما تكون $0 < \alpha < 1$ ، وان \hat{e} تمثل البوافي المقدرة من الانماذج و $\hat{\sigma}^2$ التباين المقدر.



5. الجانب التجريبي

يتضمن هذا المبحث استخدام معايير المعلومات المتقدم ذكرها في المبحث (4)، بالتحديد معيار AIC و HQ(c=3) و FPE و SIC و MDIC بمعاملة α ، لغرض المقارنة بين تلك المعايير وتحديد فاعليتها في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات. لقد تم استعمال برنامج الـ Matlab لكتابة البرامج للحصول على نتائج تجارب المحاكاة لكل تجربة معتمدة في البحث، وقد كررت كل تجربة 500 مرة. أذ تم تنفيذ تجارب المحاكاة من خلال توليد سلاسل زمنية لأربعة من نماذج الانحدار الذاتي وكالاتي:

الأنموذج رقم (AR(1)) - (1) :

$$x_t = -0.6x_{t-1} + e_t$$

الأنموذج رقم (AR(2)) - (2) :

$$x_t = 0.64x_{t-1} - 0.11x_{t-2} + e_t$$

الأنموذج رقم (AR(3)) - (3) :

$$x_t = -0.11x_{t-1} + 0.86x_{t-2} - 0.07x_{t-3} + e_t$$

الأنموذج رقم (AR(4)) - (4) :

$$x_t = -0.16x_{t-1} + 0.69x_{t-2} + 0.05x_{t-3} - 0.59x_{t-4} + e_t$$

وقد استخدم التوزيع المنتظم المستمر بالفترة [1,1-] لتوليد قيم معلمات نماذج الانحدار الذاتي الاربعة والتي تحقق الشرط ($\phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_p < 1$) ، لتوليد سلاسل زمنية مستقرة [8]. اما توزيع حد الخطأ e_t لكل سلسلة من السلاسل اعلاه، فقد اختير التوزيع الطبيعي بقيم مختلفة لمعلماته (المتوسط والتباين) لدراسة تاثيرها على اداء وفاعلية معايير المعلومات المستخدمة في المبحث (4) لتحديد رتبة انموذج AR. وقد اختير توزيع حد الخطأ e_t بالحالة $e_t \sim N(0, 1)$ و $e_t \sim N(1, 1)$ و $e_t \sim N(0, 2)$. وقد تم تقدير $n = 60, 80, 150, 250, 500$. وقد تم تقييم كل انموذج من النماذج اعلاه لعدة نماذج من AR(1) الى AR(8). انظر الخوارزمية المرفقة في الملحق، التي توضح حساب قيمة كل معيار من المعايير المعتمدة في المقارنة لأنموذج AR(1) الذي ولدت منه البيانات والتي يمكن تعليمها لبقية النماذج الثلاثة الاخيرة التي يعتمد عليها في توليد البيانات.

في البداية كان لا بد لنا من التحري عن قيمة α المستعملة في حساب معيار معلومات الانحراف المعياري (MDIC) ، والمعتمدة كعامل للموازنة بين الاذاحات الصغيرة والكبيرة لأنموذج. ولهذا فقد تم تنفيذ تجارب المحاكاة لأنموذج رقم (1)، عندما يكون حد الخطأ موزع طبيعيا قياسيا ($e_t \sim N(0, 1)$) ، ولحجم عينة مقداره $n=60$ ولعدة قيم لـ α وهي $[0.01-0.9]$. وقد كررت كل تجربة 500 مرة. وقد لخصت النتائج مما تقدم ذكره بالجدول (1)، ونلاحظ منه بان اصغر قيمة لمعيار MDIC والتي تحدد الرتبة المطابقة لأنموذج الذي ولدت منه البيانات كانت 102.74 . عند القيمة $\alpha = 0.2$ و تليها القيمة 73.581 . عند القيمة $\alpha = 0.3$ انظر الجدول (1)، حيث ان الخلايا المظللة تعني تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج AR(1) الذي ولدت منه البيانات. وعموما نلاحظ تزايد في قيمة المعيار MDIC بزيادة قيمة α .



جدول (1) يبين قيم معيار معلومات الانحراف المقترن $MDIC$ ولكل قيم $\alpha = [0.01-0.9]$ والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (1)، عندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N(0,1)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
0.01	- 1748.3	-1771.7	- 1807.3	- 1831.3	- 1856.4	- 1890.2	- 1947.8	-1964.3
0.1	-190.04	- 192.17	- 193.08	- 195.66	- 197.89	-199	-201.61	-201.38
0.2	-102.74	- 102.69	- 102.39	- 102.37	-101.5	-100.24	-98.745	-98.379
0.3	-73.581	- 73.265	- 72.138	- 70.293	- 68.012	- 65.116	- 60.808	-55.845
0.4	-58.983	- 58.128	- 56.479	- 52.683	- 48.722	- 43.747	- 36.607	-26.216
0.5	-50.516	- 48.285	- 46.107	- 41.826	- 35.948	- 27.636	- 16.652	-0.3940
0.6	-44.306	- 42.865	-38.97	- 33.121	- 25.603	-14.546	2.1037	25.052
0.7	-40.564	- 37.522	- 33.509	- 27.009	- 16.901	-0.991	21.394	54.163
0.8	-36.936	-33.994	- 28.915	- 20.844	-7.8433	12.106	42.096	86.107
0.9	-34.413	- 31.052	- 25.517	-15.345	0.27091	24.684	63.853	123.59

- *الخلايا المظللة تعني تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات.
- وبناءً على ما تقدم ذكره فقد تم تنفيذ تجربتين المحاكاة لكل انموذج من النماذج الاربعة المتقدم ذكرها، عندما يكون حد الخطأ موزع طبيعياً قياسياً ($e \sim N(0, 1)$) ، ولحجم عينة مقدار $n=150$ ولعدة قيم α تكون $\alpha = [0.01-0.5]$ ، وقد كررت كل تجربة 500 مرة، وقد لخصت النتائج مما تقدم ذكره بالجدول (2)، ونلاحظ منه بان اصغر قيمة لمعيار $MDIC$ والتي تحدد الرتبة المطابقة
- للأنموذج رقم (1) الذي ولدت منه البيانات كانت 255.33- عند القيمة $\alpha = 0.2$ ، ونلاحظ تزايد في قيمة المعيار $MDIC$ بزيادة قيمة α .
 - للأنموذج رقم (2) الذي ولدت منه البيانات كانت 183.01- عند القيمة $\alpha = 0.3$.
 - للأنموذج رقم (3) الذي ولدت منه البيانات كانت 182.55- عند القيمة $\alpha = 0.3$.
 - للأنموذج رقم (4) الذي ولدت منه البيانات كانت 255.01- عند القيمة $\alpha = 0.2$ ، ونلاحظ تزايد في قيمة المعيار $MDIC$ بزيادة قيمة α .
 - تزداد جودة تقدير الرتبة بانخفاض قيمة α بثبات حجم العينة.
- نستنتج من الجدولين (1و2) بان افضل قيمة α عند القيمتين $0.2, 0.3 = \alpha$ والتي تمثل افضل القيم التي توازن بين الاذاحت الصغيرة والكبيرة للأنموذج.



دراسة مقارنة لمعايير المعلمات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (2) يبين قيم معيار معلمات الانحراف المفترض MDIC وكل قيم α [0.01-0.5]= والتي اعتمدت لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي (AR(p)) للسلسل المولدة من النماذج الاربعة المفترضة في البحث، عندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N(0,1)$.

n=150	لأنموذج الانحدار الذاتي رقم (1)							
	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
0.01	- 4331.2	- 4350.4	-4362.4	-4415.2	- 4414.5	- 4452	- 4483.4	-4490.6
0.1	- 471.75	- 471.19	- 473.25	- 472.39	-478.24	-476.4	- 478.45	- 482.1
0.2	-255.33	- 254.13	- 255.15	-253.9	- 255.03	- 252.62	- 250.16	-248.12
0.3	-183.24	-182.78	-181.54	- 180.21	-177.8	- 175.49	-169.46	-164.26
0.4	-147.58	- 146.66	-144.19	- 141.96	-137.65	- 132.82	-124.73	-114.69
0.5	-126.33	- 124.78	- 121.86	- 117.46	- 111.53	-104.1	- 92.306	-76.359
n=150	لأنموذج الانحدار الذاتي رقم (2)							
0.01	- 4295.7	- 4374.4	- 4365.4	- 4392	- 4409	- 4471.8	- 4475.1	-4523.9
0.1	- 465.99	- 470.77	- 472.73	- 474.72	- 476.81	- 478.26	- 478.25	-478.34
0.2	- 253.42	-254.69	-255.76	- 255.19	-253.9	- 252.13	- 248.98	- 248.61
0.3	- 182.91	-183.01	-182	- 180.98	-177.25	- 173.86	-169.94	-163.99
0.4	-146.99	- 146.29	- 145.09	-142.1	- 137.95	-131.48	-124.33	-114.94
0.5	-125.18	-124.73	- 122.45	-117.74	- 112.39	-103.79	- 92.201	-76.401
n=150	لأنموذج الانحدار الذاتي رقم (3)							
0.01	- 2297.5	- 4317.5	- 4365.5	- 4398.1	- 4403.3	- 4445	- 4451.6	-4499.2
0.1	- 248.32	- 468.3	- 471.59	- 474.03	- 473.41	- 476.78	- 478.87	-477.28
0.2	-135.14	-255.22	- 254.62	- 254.7	-253.33	-251.87	- 251.27	- 247.44
0.3	- 97.508	- 182.49	-182.55	- 179.19	-178.14	-174.52	-170.11	-165.01
0.4	-78.18	-147.19	- 145.23	- 141.75	- 136.65	- 132.27	- 124.54	-114.34
0.5	- 66.138	-124.43	- 121.45	-118	- 111.89	-104.21	- 92.23	-76.38
n=150	لأنموذج الانحدار الذاتي رقم (4)							
0.01	0.897	- 3745.3	- 3800.2	- 4382.6	-4407.9	- 4470.2	- 4483.2	-4500.6
0.1	1.145	- 411.22	- 410.54	- 473.43	- 473.7	- 479.11	- 477.39	- 481.1
0.2	1.3065	- 220.44	- 222.21	-255.01	- 254.59	- 253.16	- 250.94	- 248.33
0.3	1.458	-158.16	-158.18	-180.61	- 177.94	- 174.18	- 168.96	-164.74
0.4	1.602	- 126.22	-125.56	-142.56	- 137.55	- 131.86	- 124.75	-114.63
0.5	1.737	- 107.29	-106.39	-118.28	- 112.19	-103.08	- 92.006	-76.829

* الخلية المظللة تعني تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات.

ولهذا السبب فقد اختيرت القيمة $\alpha = 0.25$ في حساب معيار معلمات الانحراف المحور (MDIC) وكل السلسل الزمنية المولدة من النماذج الاربعة المفترضة في البحث، وكل التوزيعات المفترضة لحد الخطأ، وكل حجوم العينات قيد البحث.

فقد تم تنفيذ تجارب المحاكاة لكل أنموذج من النماذج الاربعة، عندما يكون حد الخطأ موزع طبيعياً قياسياً ($e_t \sim N(0,1)$ ، وكل حجوم العينات المفترضة في البحث $n=60,80,150,250,500$). وقد كررت كل تجربة 500 مرة، وقد لخصت النتائج مما تقدم ذكره بالجدول (3-6). وقد ظلت الخلايا التي تحدد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات.



- ومن الجدول (3) للنموذج رقم (1)-AR(1) الذي ولد منه البيانات، نلاحظ بـ:
- معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE ثم معيار SIC ثم معيار HQ ، عندما تكون قيمة $n=60,80$.
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE ثم معيار HQ ثم معيار SIC ، عندما تكون قيمة $n=150,250,500$.
 - جودة تقدير الرتبة تزداد لمعيار SIC بزيادة حجم العينة للعينات $n=60,80,120$.
 - جودة تقدير الرتبة تزداد للمعيارين FPE و MDIC بزيادة حجم العينة. في حين تكون جودة تقدير الرتبة للمعيارين AIC و HQ متذبذبة بزيادة ونقصان بزيادة حجم العينة.
 - ومن الجدول (4) للنموذج رقم (2)-AR(2) الذي ولد منه البيانات، نلاحظ بـ:
 - تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولد منه البيانات، عندما تكون قيمة $n=60,80$.
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة (212.59) ثم يليه معيار AIC عند القيمة (0.0018) ثم يليه معيار FPE عند القيمة (1.009)، عندما تكون قيمة $n=150$.
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE ثم معيار HQ ثم معيار SIC ، عندما تكون قيمة $n=250,500$.
 - جودة تقدير الرتبة تزداد للمعيارين AIC و MDIC بزيادة حجم العينة للعينات $n=[150-500]$, في حين تكون جودة تقدير الرتبة للمعيارين FPE متذبذبة بزيادة ونقصان بزيادة حجم العينة للعينات $n=[150-500]$.
 - فاعلية معيار SIC و HQ في تقدير الرتبة تكون افضل عند $n=250$.
 - ومن الجدول (5) للنموذج رقم (3)-AR(3) الذي ولد منه البيانات ، نلاحظ بـ:
 - معيار AIC يمتلك اصغر قيمة (0.0375) ثم يليه معيار FPE عند القيمة (1.0574)، عندما تكون قيمة $n=60$.
 - تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولد منه البيانات، عندما تكون قيمة $n=80,150,250$.
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة (-706.13) ثم يليه معيار AIC عند القيمة (0.0002) ثم يليه معيار FPE عند القيمة (1.002)، عندما تكون قيمة $n=500$.
 - ومن الجدول (6) للنموذج رقم (4)-AR(4) الذي ولد منه البيانات، نلاحظ بـ:
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE ثم معيار HQ ثم معيار SIC ، عندما تكون قيمة $n=60,80$.
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE ثم معيار HQ ثم معيار SIC ، عندما تكون قيمة $n=150,250$.
 - تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولد منه البيانات، عدا معيار HQ الذي يمتلك اصغر قيمة (4506.8) ثم يليه معيار SIC عند القيمة (4509.8)، عندما تكون قيمة $n=500$.
 - جودة تقدير الرتبة تزداد للمعيارين AIC و MDIC بزيادة حجم العينة عدا $n=500$.
 - فاعلية معيار SIC و HQ في تقدير الرتبة تكون افضل كلما قل حجم العينة .



دراسة مقارنة لمعايير المعلمات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (3) يبين قيم معايير المعلمات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المفترض $\alpha = 0.25$ والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (1)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (0,1)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	0.004	0.017	0.040	0.048	0.059	0.082	0.086	0.0828
SIC	2.3293	5.183	8.656	11.239	14.02	17.514	19.808	21.686
HQ(c=3)	2.4637	5.4515	9.0592	11.777	14.692	18.32	20.749	22.762
FPE	1.0235	1.0341	1.0594	1.068	1.0822	1.1092	1.1142	1.112
MDIC	-85.247	- 85.022	-84.027	-83.173	-81.754	-79.164	- 76.777	-73.945
n=80								
AIC	0.009	0.021	0.022	0.039	0.050	0.048	0.058	0.083
SIC	3.12	6.419	8.868	12.656	15.942	18.098	21.35	25.687
HQ(c=3)	3.1703	6.5204	9.0194	12.858	16.194	18.401	21.703	26.091
FPE	1.0223	1.0343	1.0348	1.0539	1.0676	1.0638	1.0761	1.1056
MDIC	-113.1	- 112.78	-112.82	-110.98	-109.51	-107.92	- 105.25	-100.43
n=150								
AIC	- 0.008	- 0.005	0.012	0.021	0.025	0.028	0.042	0.047
SIC	1.827	5.3301	10.897	15.243	18.799	22.235	27.349	31.187
HQ(c=3)	1.6511	4.9782	10.369	14.539	17.919	21.179	26.117	29.779
FPE	0.999	1.002	1.021	1.028	1.033	1.035	1.051	1.056
MDIC	-213.04	- 212.93	-211.29	-209.72	-208.47	-206.05	- 202.57	-198.52
n=250								
AIC	0.001	0.002	0.005	0.004	0.017	0.021	0.012	0.028
SIC	3.6663	7.634	11.899	15.054	21.764	26.299	27.765	35.178
HQ(c=3)	3.2708	6.843	10.713	13.472	19.786	23.926	24.997	32.014
FPE	1.0047	1.0068	1.009	1.0084	1.021	1.0248	1.0168	1.0329
MDIC	-353.75	-353.12	-352.36	-352.46	-348.91	-346.63	- 345.53	-339.91
n=500								
AIC	- 0.003	- 0.001	0.001	0.008	0.010	0.006	0.015	0.013
SIC	2.7532	7.7455	13.369	20.862	26.055	28.368	37.077	40.394
HQ(c=3)	2.0193	6.2777	11.167	17.927	22.385	23.965	31.94	34.522
FPE	0.999	1.001	1.004	1.010	1.012	1.008	1.018	1.016
MDIC	-707.13	-706.6	-705.52	-702.97	-701.21	-700.77	- 695.17	-692.68

* الخلية المظللة تعني تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات.



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (4) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المقترن $\alpha (=0.25)$ والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (2)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N~(0,1)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	0.0103	0.0219	0.0395	0.0441	0.0624	0.0799	0.0899	0.0763
SIC	2.711	5.5011	8.6534	11.022	14.218	17.358	20.052	21.316
HQ(c=3)	2.8455	5.77	9.0569	11.559	14.891	18.165	20.993	22.392
FPE	1.0308	1.0394	1.0601	1.0634	1.0858	1.1062	1.1182	1.1045
MDIC	- 85.041	- 84.808	- 84.061	- 83.316	- 81.559	- 79.26	- 76.573	- 74.254
n=80								
AIC	0.0083	0.0151	0.015	0.0249	0.0473	0.0339	0.0651	0.0746
SIC	3.0462	5.9684	8.3461	11.517	15.698	17.002	21.882	25.025
HQ(c=3)	3.0967	6.0694	8.4976	11.719	15.95	17.305	22.235	25.429
FPE	1.0209	1.0293	1.029	1.0402	1.0628	1.0506	1.0831	1.0945
MDIC	- 113.09	- 112.88	- 112.99	- 111.93	- 109.67	- 108.89	- 104.7	- 101.11
n=150								
AIC	0.0171	0.0018	0.0183	0.0174	0.0283	0.0328	0.0414	0.0317
SIC	5.5787	6.2976	11.781	14.651	19.301	22.986	27.289	28.841
HQ(c=3)	5.4028	5.9457	11.254	13.947	18.421	21.93	26.058	27.433
FPE	1.0237	1.009	1.0246	1.0257	1.0362	1.0404	1.0506	1.0397
MDIC	- 210.37	- 212.59	- 210.29	- 210.2	- 207.79	- 206.04	- 202.68	- 200.25
n=250								
AIC	0.0105	- 0.0048	0.0105	0.0091	0.0084	0.0187	0.0230	0.0247
SIC	6.1423	5.8503	13.185	16.358	19.71	25.812	30.392	34.357
HQ(c=3)	5.7467	5.0593	11.998	14.776	17.732	23.439	27.623	31.192
FPE	1.014	0.99967	1.0147	1.013	1.0128	1.0232	1.0274	1.0295
MDIC	- 351.3	- 354.6	- 351.6	- 351.45	- 350.29	- 347.28	- 343.91	- 340.18
n=500								
AIC	0.0083	- 0.0004	0.0056	0.0073	0.0049	0.0143	0.0105	0.0136
SIC	8.3593	8.2257	15.449	20.527	23.365	32.461	34.773	40.507
HQ(c=3)	7.6254	6.7579	13.247	17.591	19.696	28.057	29.636	34.636
FPE	1.0106	1.0017	1.0078	1.0095	1.0065	1.0166	1.0128	1.0158
MDIC	- 702.99	- 706.35	- 704.24	- 703.26	- 703.03	- 697.76	- 697.02	- 692.14



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (5) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المفترض $\alpha = 0.25$ والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (3)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (0,1)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	1.1941	0.0380	0.0375	0.0533	0.0619	0.0738	0.0716	0.1004
SIC	73.739	6.4659	8.5325	11.575	14.183	16.996	18.958	22.776
HQ(c=3)	73.874	6.7348	8.936	12.113	14.856	17.803	19.899	23.852
FPE	3.6181	1.0594	1.0574	1.0748	1.0871	1.0977	1.0998	1.1305
MDIC	- 46.801	- 84.15	- 83.939	- 82.891	- 81.732	- 79.481	- 77.448	- 73.201
n=80								
AIC	1.2163	0.0102	0.0298	0.0294	0.0332	0.0397	0.0549	0.0747
SIC	99.686	5.5826	9.534	11.881	14.563	17.467	21.065	25.029
HQ(c=3)	99.736	5.6836	9.6855	12.083	14.816	17.77	21.419	25.433
FPE	3.6438	1.0237	1.0446	1.044	1.0486	1.0578	1.0731	1.0956
MDIC	- 61.677	- 113.31	- 112.25	- 111.93	- 110.61	- 108.73	-105.41	- 100.93
n=150								
AIC	1.2868	0.0125	0.0182	0.0221	0.0252	0.0332	0.0396	0.0509
SIC	196.04	7.8904	11.762	15.351	18.826	23.041	27.013	31.721
HQ(c=3)	195.86	7.5385	11.234	14.648	17.946	21.985	25.781	30.314
FPE	3.7542	1.0189	1.025	1.0305	1.0322	1.0414	1.0468	1.0603
MDIC	- 110.98	- 211.27	- 210.71	- 209.79	- 208.37	- 205.75	- 202.65	-198.21
n=250								
AIC	1.2923	0.0102	0.0115	0.0141	0.0135	0.0244	0.0190	0.0252
SIC	326.61	9.5874	13.444	17.617	20.974	27.224	29.408	34.46
HQ(c=3)	326.21	8.7963	12.258	16.035	18.997	24.85	26.639	31.296
FPE	3.7373	1.0141	1.0154	1.0179	1.0177	1.0292	1.0237	1.03
MDIC	- 184.8	- 351.52	- 351.4	- 350.45	- 349.22	- 346.32	- 344.69	- 339.81
n=500								
AIC	1.3139	0.006	0.0002	0.0041	0.0068	0.0135	0.0145	0.0105
SIC	661.16	11.438	12.733	18.888	24.484	32.044	36.768	38.962
HQ(c=3)	660.42	9.9706	10.531	15.952	20.814	27.641	31.631	33.091
FPE	3.7673	1.0082	1.002	1.0061	1.0087	1.0156	1.0167	1.0126
MDIC	- 365.53	- 704.4	- 706.13	- 704.24	- 702.46	- 698.05	- 695.14	- 693.33



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (6) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المقترن $\alpha = 0.25$ (MDIC) والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (4)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (0,1)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	7.631	0.3059	0.2941	0.0452	0.0725	0.0610	0.0864	0.0920
SIC	459.95	22.543	23.931	11.089	14.82	16.228	19.841	22.278
HQ(c=3)	460.09	22.812	24.335	11.626	15.492	17.034	20.783	23.353
FPE	3972.3	1.3995	1.3796	1.0668	1.0956	1.0874	1.1138	1.1236
MDIC	- 1.6077	- 73.249	- 73.443	- 83.28	- 81.042	- 80.26	- 76.766	- 73.634
n=80								
AIC	10.808	0.2941	0.3098	0.0365	0.0443	0.0490	0.0587	0.0503
SIC	867.04	28.288	31.929	12.45	15.457	18.212	21.372	23.077
HQ(c=3)	867.09	28.389	32.08	12.652	15.709	18.515	21.725	23.481
FPE	85663	1.3696	1.391	1.0513	1.0613	1.0646	1.0769	1.0685
MDIC	0.58129	-97.976	- 96.89	- 111.23	- 109.77	- 107.89	-105.17	-102.63
n=150								
AIC	22.162	0.2918	0.2988	0.0133	0.0291	0.0316	0.0354	0.0590
SIC	3327.3	49.79	53.853	14.038	19.423	22.8	26.384	32.932
HQ(c=3)	3327.1	49.438	53.326	13.334	18.543	21.745	25.152	31.525
FPE	7.2127 e+009	1.3536	1.364	1.0205	1.0381	1.0391	1.0449	1.0688
MDIC	1.383	- 183.43	-182.43	- 210.58	- 207.65	- 205.93	- 203.28	-197.5
n=250								
AIC	38.454	0.2933	0.2865	0.0107	0.0150	0.0242	0.0239	0.0275
SIC	9617	80.363	82.182	16.756	21.345	27.168	30.635	35.046
HQ(c=3)	9616.6	79.572	80.995	15.174	19.367	24.795	27.866	31.882
FPE	8.9247 e+016	1.3494	1.3415	1.0145	1.0196	1.0289	1.0285	1.0318
MDIC	1.3884	- 304.96	- 305.74	- 351.28	- 349.54	- 346.09	-344.1	- 339.58
n=500								
AIC	80.347	8.6342	9.032	8.9858	9.1275	9.0472	9.0899	9.0124
SIC	40178	4325.5	4528.7	4509.8	4584.8	4548.9	4574.4	4539.9
HQ(c=3)	40177	4324.1	4526.5	4506.8	4581.2	4544.5	4569.3	4534
FPE	1.3882 e+035	16461	24674	24777	24349	22548	25202	23421
MDIC	1.3884	-15.246	- 11.337	- 9.2496	- 3.7594	- 0.5730	4.3781	8.6745

وكذلك تم تنفيذ تجارب المحاكاة لكل انموذج من النماذج الاربعة، عندما يكون حد الخطأ موزع طبيعيا ($N(1,1)$ ~ e)، ولكل حجوم العينات المفترضة في البحث $n=60,80,150,250,500$. وقد كرت كل تجربة 500 مرة، وقد لخصت النتائج مما تقدم ذكره بالجداول (7-10). وقد ظلت الخلايا التي تحدد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات.



- ومن الجدول (7) للنموذج رقم (1)-(AR1) الذي ولدت منه البيانات، نلاحظ بـ:
- تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات، عدا معيار SIC الذي يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار HQ، عندما تكون قيمة $n=60,80$.
 - تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات، عدا معيار HQ الذي يمتلك اصغر قيمة (30.28) ثم يليه معيار SIC عند القيمة (30.456)، عندما تكون قيمة $n=150$.
 - تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات، عندما تكون قيمة $n=250,500$.
 - فاعلية المعيارين SIC و HQ في تقدير الرتبة تزداد كلما قل حجم العينة للعينات [60-150].
 - ومن الجدول (8) للنموذج رقم (2) - AR(2) الذي ولدت منه البيانات، نلاحظ بـ كل المعايير المستخدمة في المقارنة تفشل في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات ، وكل حجوم العينات قيد البحث. والشئ نفسه للجدول (9) للنموذج رقم (3)- AR(3).
 - ومن الجدول (10) للنموذج رقم (4)- AR(4) الذي ولدت منه البيانات، نلاحظ بـ:
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة (77.997) ثم يليه معيار AIC عند القيمة (0.1689) ثم يليه معيار FPE عند القيمة (1.2081) ثم معيار SIC عند القيمة (18.512) ثم يليه معيار HQ عند القيمة (19.05)، عندما تكون قيمة $n=60$.
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة (103.16) ثم يليه معيار SIC عند القيمة (23.899) ثم يليه معيار HQ عند القيمة (24.101)، عندما تكون قيمة $n=80$.
 - معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة (195.97) ثم يليه معيار HQ عند القيمة (34.561) ثم يليه معيار SIC عند القيمة (35.265)، عندما تكون قيمة $n=150$.
 - معيار HQ يمتلك اصغر قيمة (49.421) ثم يليه معيار SIC عند القيمة (51.003)، عندما تكون قيمة $n=250$.
 - تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات، عندما تكون قيمة $n=500$.
 - فاعلية المعيارين SIC و HQ في تقدير الرتبة تزداد كلما قل حجم العينة.
 - جودة تقدير الرتبة لمعيار MDIC تزداد بزيادة حجم العينة للعينات [60-150].



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (7) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومتغير معلومات الانحراف المقترن $\alpha (=0.25)$ والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (1)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (1,1)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	0.1928	0.1792	0.1937	0.1733	0.1818	0.1772	0.1852	0.1843
SIC	13.66	14.941	17.905	18.776	21.38	23.199	25.77	27.811
HQ(c=3)	13.794	15.21	18.309	19.314	22.053	24.006	26.711	28.886
FPE	1.2342	1.2195	1.2364	1.2142	1.2242	1.2191	1.2292	1.2325
MDIC	- 77.465	- 77.977	- 77.441	- 77.724	- 76.225	- 74.881	- 72.233	- 69.086
n=80								
AIC	0.1786	0.1864	0.1630	0.1706	0.1601	0.1510	0.1726	0.1636
SIC	16.672	19.673	20.182	23.179	24.721	26.374	30.482	32.146
HQ(c=3)	16.722	19.774	20.334	23.381	24.974	26.677	30.836	32.55
FPE	1.2104	1.2231	1.1922	1.2031	1.1926	1.181	1.2067	1.1982
MDIC	- 103.71	- 103.52	- 104.63	- 103.54	- 103.14	- 101.99	- 98.3	- 95.832
n=150								
AIC	0.1830	0.1677	0.1511	0.1488	0.1489	0.1383	0.1319	0.1345
SIC	30.456	31.169	31.689	34.355	37.391	38.811	40.855	44.265
HQ(c=3)	30.28	30.817	31.161	33.651	36.511	37.755	39.624	42.857
FPE	1.2097	1.1913	1.1714	1.1695	1.1689	1.1569	1.1493	1.1537
MDIC	- 193.68	- 195.26	- 196.92	- 196.28	- 194.99	- 194.48	- 192.67	- 189.35
n=250								
AIC	0.1801	0.1664	0.1485	0.1419	0.1241	0.1178	0.1165	0.108
SIC	48.541	48.639	47.697	49.564	48.626	50.565	53.785	55.171
HQ(c=3)	48.145	47.848	46.511	47.982	46.648	48.192	51.017	52.007
FPE	1.202	1.1858	1.1648	1.1577	1.1373	1.1298	1.129	1.1189
MDIC	- 322.92	- 325.01	- 327.88	- 328.17	- 330.4	- 329.5	- 327.17	- 325.33
n=500								
AIC	0.1877	0.1552	0.1425	0.1289	0.1168	0.1105	0.0992	0.0967
SIC	98.07	86.036	83.896	81.312	79.45	80.542	79.108	82.072
HQ(c=3)	97.336	84.568	81.695	78.376	75.781	76.138	73.97	76.2
FPE	1.209	1.1705	1.1556	1.14	1.126	1.1188	1.1064	1.1039
MDIC	- 642.51	- 653.83	- 657.11	- 661.11	- 663.68	- 664.25	- 665.51	- 663.55

* الخلية المظللة تعني تحديد الرتبة المطابقة لانموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات.



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (8) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المقترن $\alpha (=0.25)$ والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (2)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N\sim(1,1)$

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	0.7098	0.3653	0.2960	0.2480	0.2484	0.2367	0.2211	0.2071
SIC	44.679	26.108	24.045	23.255	25.378	26.767	27.926	29.178
HQ(c=3)	44.814	26.377	24.448	23.793	26.051	27.574	28.867	30.253
FPE	2.0683	1.4634	1.3686	1.3065	1.3081	1.2953	1.2759	1.2601
MDIC	- 58.676	- 70.687	- 73.184	- 74.504	- 73.341	- 72.205	- 70.601	-67.992
n=80								
AIC	0.7069	0.3677	0.2779	0.2401	0.221	0.2056	0.1888	0.2001
SIC	58.933	34.183	29.378	28.733	29.59	30.743	31.78	35.065
HQ(c=3)	58.984	34.284	29.529	28.935	29.843	31.046	32.134	35.469
FPE	2.0544	1.4657	1.3384	1.289	1.2661	1.2467	1.2294	1.2432
MDIC	- 78.224	- 94.245	- 98.531	- 99.843	- 99.634	- 98.801	- 97.477	- 93.424
n=150								
AIC	0.7112	0.3461	0.2775	0.2211	0.1910	0.1801	0.1616	0.1568
SIC	109.69	57.94	50.652	45.213	43.708	45.085	45.312	47.605
HQ(c=3)	109.51	57.588	50.124	44.509	42.828	44.03	44.08	46.198
FPE	2.0498	1.4232	1.3279	1.2561	1.2192	1.2057	1.1839	1.1781
MDIC	- 146.45	- 178.28	- 184.35	-189	-191	-190.05	- 189.63	- 186.58
n=250								
AIC	0.7122	0.3569	0.2649	0.2201	0.1851	0.1745	0.1496	0.1364
SIC	181.58	96.273	76.776	69.105	63.892	64.761	62.038	62.262
HQ(c=3)	181.18	95.482	75.59	67.523	61.914	62.387	59.27	59.098
FPE	2.0468	1.4343	1.3081	1.2519	1.2083	1.1957	1.1672	1.151
MDIC	- 243.38	- 295.15	- 308.85	- 315.52	- 319.97	- 319.68	-321.4	-320.66
n=500								
AIC	0.7200	0.3446	0.2568	0.2122	0.1801	0.1552	0.1374	0.1311
SIC	364.2	180.73	141.04	122.95	111.13	102.88	98.208	99.266
HQ(c=3)	363.47	179.26	138.84	120.02	107.46	98.478	93.071	93.395
FPE	2.0584	1.4144	1.2951	1.239	1.2	1.1707	1.1496	1.1426
MDIC	- 484.77	- 592.73	- 620.09	- 633.95	- 643.05	- 649	- 652.98	-651.99



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (9) بيّن قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المقترن $\alpha = 0.25$ MDIC (=0.25) والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (3)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (1,1)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	1.2592	0.6879	0.3895	0.3176	0.2703	0.2614	0.2253	0.2206
SIC	77.646	45.46	29.651	27.435	26.689	28.248	28.177	29.988
HQ(c=3)	77.781	45.729	30.054	27.973	27.361	29.055	29.119	31.064
FPE	3.813	2.022	1.5042	1.3992	1.3348	1.3306	1.28	1.2751
MDIC	- 45.216	- 59.132	-69.54	- 71.727	- 72.456	- 71.209	- 70.302	- 67.321
n=80								
AIC	1.3313	0.6940	0.3746	0.3103	0.2691	0.2277	0.2190	0.2198
SIC	108.89	60.287	37.116	34.352	33.438	32.511	34.194	36.644
HQ(c=3)	108.94	60.388	37.268	34.554	33.691	32.814	34.547	37.048
FPE	4.0084	2.0247	1.473	1.3827	1.328	1.2742	1.2645	1.2687
MDIC	- 57.936	- 78.573	- 93.449	- 95.863	- 97.052	- 97.446	- 95.698	-92.176
n=150								
AIC	1.3383	0.6750	0.3714	0.2907	0.2361	0.2030	0.1926	0.1771
SIC	203.75	107.27	64.74	55.654	50.466	48.518	49.964	50.656
HQ(c=3)	203.58	106.92	64.212	54.95	49.586	47.462	48.732	49.248
FPE	3.947	1.9758	1.4608	1.3462	1.2761	1.2335	1.2231	1.2029
MDIC	- 108.28	- 148.78	- 175.57	- 182.21	- 186.38	- 187.63	- 186.46	-184.51
n=250								
AIC	1.375	0.6817	0.3625	0.2673	0.2268	0.1963	0.1613	0.1596
SIC	347.26	177.46	101.18	80.912	74.309	70.203	64.979	68.075
HQ(c=3)	346.86	176.66	99.993	79.33	72.331	67.83	62.21	64.911
FPE	4.0383	1.9841	1.4423	1.3126	1.2602	1.2217	1.1804	1.1784
MDIC	- 177.28	- 247.11	- 293.72	- 307.92	- 313.11	- 316.27	- 319.53	-316.43
n=500								
AIC	1.3833	0.6826	0.3572	0.2723	0.2163	0.1826	0.1647	0.1411
SIC	695.85	349.73	191.22	153.03	129.23	116.59	111.84	104.26
HQ(c=3)	695.12	348.26	189.02	150.09	125.56	112.19	106.7	98.39
FPE	4.0351	1.9828	1.4324	1.3159	1.2443	1.2027	1.1821	1.1539
MDIC	- 352.97	- 493.81	- 589.12	- 614.75	-631	- 640.39	- 643.82	- 648.07



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (10) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المفترض α ($=0.25$) والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (4)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (1,1)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	7.7571	1.7303	0.8427	0.1689	0.1711	0.2074	0.1796	0.1882
SIC	467.52	108.01	56.847	18.512	20.738	25.012	25.438	28.049
HQ(c=3)	467.65	108.28	57.251	19.05	21.411	25.819	26.379	29.125
FPE	4311.7	5.7567	2.4121	1.2081	1.2123	1.2575	1.2241	1.2366
MDIC	- 1.3387	- 32.105	-54.542	-77.997	- 76.691	- 73.595	-72.542	-68.951
n=80								
AIC	10.954	1.7281	0.8293	0.1796	0.1608	0.1762	0.1649	0.1509
SIC	878.67	143.01	73.492	23.899	24.777	28.391	29.866	31.124
HQ(c=3)	878.72	143.11	73.643	24.101	25.03	28.694	30.219	31.529
FPE	97570	5.7251	2.3677	1.216	1.191	1.2119	1.1995	1.183
MDIC	0.6772	- 43.242	- 73.594	- 103.16	- 103.12	-100.54	- 98.881	-96.591
n=150								
AIC	22.134	1.7158	0.8238	0.1548	0.1493	0.1543	0.1425	0.1365
SIC	3323.1	263.39	132.61	35.265	37.455	41.203	42.447	44.557
HQ(c=3)	3322.9	263.04	132.08	34.561	36.575	40.147	41.215	43.15
FPE	7.4159 e+009	5.6113	2.3185	1.1759	1.1697	1.1756	1.1624	1.1543
MDIC	1.3828	- 82.714	-138.9	- 195.97	- 195.18	- 192.85	- 191.61	-188.87
n=250								
AIC	38.624	1.7185	0.8391	0.1477	0.1382	0.1277	0.1196	0.1179
SIC	9659.6	436.68	220.35	51.003	52.161	53.049	54.55	57.645
HQ(c=3)	9659.2	435.89	219.16	49.421	50.183	50.676	51.782	54.481
FPE	1.0688 e+017	5.6014	2.3336	1.1638	1.1539	1.1411	1.1321	1.1304
MDIC	1.3884	- 138.27	- 230.29	-327.2	- 328.13	- 327.91	- 326.77	-323.63
n=500								
AIC	80.435	8.6983	9.102	8.9707	9.1774	9.0622	9.1691	9.0647
SIC	40221	4357.6	4563.6	4502.2	4609.8	4556.4	4614.1	4566.1
HQ(c=3)	40221	4356.1	4561.4	4499.3	4606.1	4552	4608.9	4560.2
FPE	1.5495 e+035	17155	24550	24049	23991	25058	26822	27278
MDIC	1.3884	- 14.105	- 8.8881	-7.948	- 2.6268	-0.6421	4.2715	7.9309

وتم تنفيذ تجارب المحاكاة لكل انموذج من النماذج الاربعة ،عندما يكون حد الخطأ موزع طبيعي $e \sim N(0,2)$ ، وكل حجوم العينات المفترضة في البحث. وقد كررت كل تجربة 500 مرة، وقد لخصت النتائج مما تقدم ذكره بالجداول (11-14). وقد ظلت الخلايا التي تحدد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات.



ومن الجدول (11) للنموذج رقم (1)-(1) AR(1) الذي ولد منه البيانات، نلاحظ بـ:

- معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE، ثم يليه معيار SIC ثم يليه معيار HQ، عندما تكون قيمة $n=60,80$. في حين يمتلك معيار MDIC اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE، ثم يليه معيار HQ ثم يليه معيار SIC، عندما تكون قيمة $n=150,500$. وتفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولد منه البيانات عدا معيار MDIC ، عندما تكون قيمة $n=250$.
- فاعلية المعيارين SIC و HQ و FPE في تقدير الرتبة تكون افضل كلما قل حجم العينة عدا $n=250$ ، إذ فشلت تلك المعايير في تقدير الرتبة للنموذج. وان جودة تقدير الرتبة لمعيار MDIC تزداد بزيادة حجم العينة.

ومن الجدول (12) للنموذج رقم (2) - AR(2) الذي ولد منه البيانات، نلاحظ بـ :

- تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولد منه البيانات، عندما تكون قيمة $n=60,80$. في حين يمتلك معيار MDIC اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC عند القيمة ثم يليه معيار FPE، عندما تكون قيمة $n=150$. ويكون معيار MDIC المعيار الوحيد الذي يحدد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولد منه البيانات، عندما تكون قيمة $n=250$.

- معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE، ثم يليه معيار HQ ثم يليه معيار SIC، عندما تكون قيمة $n=500$. وعموماً فان جودة تقدير الرتبة لمعيار MDIC تزداد بزيادة حجم العينة للعينات $[n=150-500]$.

ومن الجدول (13) للنموذج رقم (3) - AR(3) الذي ولد منه البيانات، نلاحظ بـ :

- تفشل كل المعايير المستخدمة في المقارنة في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولد منه البيانات، عندما تكون قيمة $n=60,80,150,250$. في حين يمتلك معيار MDIC اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE، عندما تكون قيمة $n=500$.

ومن الجدول (14) للنموذج رقم (4) - AR(4) الذي ولد منه البيانات ، نلاحظ بـ:

- معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE، ثم يليه معيار SIC ثم يليه معيار HQ، عندما تكون قيمة $n=60,80$.

- معيار MDIC يمتلك اصغر قيمة ثم يليه معيار AIC ثم يليه معيار FPE، ثم يليه معيار HQ ثم يليه معيار SIC، عندما تكون قيمة $n=150,250$. في حين يمتلك معيار HQ اصغر قيمة ثم يليه معيار SIC، عندما تكون قيمة $n=500$. وتفشل بقية المعايير في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الذاتي الذي ولد منه البيانات.
- جودة تقدير الرتبة للمعايير AIC و FPE و MDIC تزداد بزيادة حجم العينة عدا العينة $n=500$ ، إذ تفشل تلك المعايير في تقدير الرتبة للنموذج.

- فاعلية المعيارين SIC و HQ في تقدير الرتبة تكون افضل كلما قل حجم العينة.



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (11) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المفترض $\alpha = 0.25$ والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (1)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (0,2)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	0.6964	0.7014	0.7171	0.7371	0.7492	0.7527	0.7708	0.7749
SIC	43.876	46.271	49.308	52.602	55.421	57.728	60.91	63.248
HQ(c=3)	44.011	46.54	49.711	53.14	56.093	58.535	61.851	64.324
FPE	2.0439	2.0525	2.0869	2.1372	2.1599	2.1633	2.209	2.2217
MDIC	- 59.839	- 59.393	- 58.305	- 56.666	- 54.727	- 52.372	- 48.984	-45.224
n=80								
AIC	0.6934	0.7058	0.7129	0.7380	0.7371	0.7540	0.7508	0.7785
SIC	57.851	61.228	64.176	68.571	70.879	74.613	76.739	81.339
HQ(c=3)	57.902	61.329	64.327	68.773	71.131	74.916	77.093	81.743
FPE	2.0261	2.0529	2.0677	2.1218	2.121	2.1601	2.1522	2.2131
MDIC	- 79.919	- 79.128	-78.18	- 76.042	-74.66	- 71.597	- 68.719	-63.845
n=150								
AIC	0.6955	0.7036	0.7018	0.7187	0.7081	0.7198	0.7203	0.7306
SIC	107.33	111.56	114.3	119.85	121.27	126.03	129.12	133.67
HQ(c=3)	107.15	111.21	113.77	119.14	120.39	124.98	127.89	132.26
FPE	2.019	2.0348	2.0313	2.0667	2.0444	2.0693	2.0701	2.0923
MDIC	-149.54	-148.62	-148.29	-145.7	-144.82	-141.71	-138.7	-134.16
n=250								
AIC	0.6949	0.6938	0.6944	0.7068	0.7080	0.7086	0.7074	0.7213
SIC	177.24	180.48	184.15	190.77	194.62	198.28	201.49	208.49
HQ(c=3)	176.84	179.69	182.97	189.19	192.64	195.91	198.72	205.32
FPE	2.0116	2.0089	2.011	2.0355	2.0382	2.0401	2.0372	2.0668
MDIC	- 249.17	- 249.08	- 248.21	- 245.81	- 243.95	- 241.48	-238.74	- 233.08
n=500								
AIC	0.6923	0.6943	0.6990	0.6966	0.7051	0.702	0.7054	0.7098
SIC	350.34	355.57	362.16	365.17	373.62	376.29	382.19	388.62
HQ(c=3)	349.6	354.1	359.96	362.24	369.95	371.88	377.05	382.75
FPE	2.0023	2.0065	2.0161	2.011	2.0282	2.0221	2.029	2.0378
MDIC	- 498.94	- 498.26	- 496.46	- 495.93	- 491.98	- 490.71	- 486.42	- 481.79

* الخلية المظللة تعني تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الانحدار الذاتي الذي ولدت منه البيانات.



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (12) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المفترض $\alpha = 0.25$ والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (2)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (0,2)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	0.6862	0.7104	0.7112	0.7468	0.7624	0.7370	0.7668	0.7684
SIC	43.263	46.81	48.957	53.186	56.216	56.785	60.665	62.861
HQ(c=3)	43.398	47.079	49.361	53.723	56.889	57.592	61.607	63.937
FPE	2.0235	2.0701	2.0735	2.1503	2.1812	2.1332	2.1999	2.2088
MDIC	- 60.286	- 59.136	- 58.607	- 56.416	- 54.408	-53.012	- 49.164	-45.518
n=80								
AIC	0.6934	0.7036	0.7259	0.7303	0.7387	0.7555	0.7668	0.7661
SIC	57.852	61.052	65.22	67.952	71.009	74.731	78.015	80.344
HQ(c=3)	57.902	61.153	65.372	68.154	71.262	75.034	78.368	80.748
FPE	2.0284	2.0482	2.0936	2.1022	2.1249	2.1572	2.1825	2.1845
MDIC	- 79.945	- 79.111	- 77.679	- 76.415	- 74.507	- 71.592	- 68.287	- 64.395
n=150								
AIC	0.7061	0.6962	0.7151	0.7084	0.7334	0.7198	0.7309	0.7384
SIC	108.93	110.45	116.3	118.3	125.06	126.03	130.71	134.85
HQ(c=3)	108.75	110.1	115.77	117.59	124.18	124.98	129.48	133.44
FPE	2.0411	2.0189	2.0591	2.0431	2.0974	2.0691	2.0911	2.108
MDIC	- 148.81	- 149.26	- 147.01	-146.46	-142.9	- 141.68	- 137.84	- 133.51
n=250								
AIC	0.7062	0.7014	0.6978	0.7073	0.7080	0.7098	0.7193	0.7181
SIC	180.08	182.38	185	190.91	194.61	198.57	204.48	207.7
HQ(c=3)	179.68	181.59	183.82	189.32	192.63	196.2	201.71	204.53
FPE	2.0335	2.0239	2.017	2.037	2.039	2.0421	2.0623	2.0595
MDIC	- 247.64	- 248.05	- 247.65	- 245.78	- 243.96	- 241.17	- 237.09	- 233.51
n=500								
AIC	0.7046	0.6904	0.6955	0.6968	0.7046	0.7070	0.7014	0.7079
SIC	356.49	353.61	360.41	365.25	373.37	378.76	380.19	387.65
HQ(c=3)	355.75	352.15	358.21	362.31	369.7	374.36	375.05	381.78
FPE	2.0272	1.9982	2.0088	2.011	2.0268	2.0319	2.0205	2.0344
MDIC	- 496.25	- 499.25	- 497.27	- 495.9	- 492.13	- 489.16	- 487.61	- 482.24



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (13) يبين قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المفترض α ($=0.25$) والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (3)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N~(0,2)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	1.8561	0.7079	0.7175	0.7275	0.7460	0.7570	0.7903	0.7779
SIC	113.46	46.662	49.33	52.028	55.23	57.985	62.076	63.427
HQ(c=3)	113.6	46.931	49.733	52.566	55.902	58.791	63.018	64.503
FPE	7.0261	2.0655	2.0868	2.1108	2.1507	2.1785	2.2519	2.2279
MDIC	- 33.265	- 59.264	- 58.285	- 56.926	- 54.866	- 52.293	-48.438	-45.105
n=80								
AIC	1.918	0.7027	0.7289	0.7308	0.7373	0.7420	0.7566	0.7464
SIC	155.82	60.983	65.46	67.993	70.892	73.655	77.198	78.768
HQ(c=3)	155.87	61.084	65.611	68.195	71.144	73.958	77.552	79.172
FPE	7.3565	2.0477	2.0989	2.105	2.1222	2.1285	2.1634	2.1443
MDIC	- 43.14	- 79.281	-77.56	- 76.257	- 74.433	- 72.091	- 68.596	-65.333
n=150								
AIC	1.9487	0.7057	0.7092	0.7130	0.7332	0.7204	0.7285	0.7416
SIC	295.32	111.87	115.41	118.99	125.03	126.12	130.35	135.32
HQ(c=3)	295.14	111.52	114.88	118.29	124.15	125.07	129.12	133.92
FPE	7.3004	2.0405	2.0464	2.056	2.0974	2.0698	2.0866	2.1146
MDIC	- 79.565	- 148.31	- 147.42	- 146.18	- 143.04	- 141.65	-138.08	-133.25
n=250								
AIC	1.995	0.7057	0.6979	0.6950	0.7131	0.7100	0.7208	0.7225
SIC	502.28	183.46	185.03	187.84	195.87	198.62	204.84	208.8
HQ(c=3)	501.89	182.67	183.85	186.26	193.89	196.24	202.07	205.64
FPE	7.5208	2.0328	2.0177	2.0121	2.0481	2.0421	2.0649	2.0684
MDIC	-129.67	- 247.42	-247.8	- 246.98	- 243.25	- 241.32	- 236.93	-232.93
n=500								
AIC	1.9903	0.6973	0.6937	0.6996	0.6951	0.7032	0.7010	0.7090
SIC	999.37	357.07	359.49	366.67	368.64	376.87	379.99	388.21
HQ(c=3)	998.64	355.61	357.29	363.73	364.97	372.47	374.85	382.34
FPE	7.4089	2.0124	2.0052	2.0172	2.0081	2.0247	2.0201	2.0364
MDIC	- 260.56	- 497.35	-497.57	-495.4	- 494.51	-490.3	- 487.66	-482.03



دراسة مقارنة لمعايير المعلومات لتحديد رتبة نماذج الانحدار الذاتي

جدول (14) بيّن قيم معايير المعلومات التقليدية ومعيار معلومات الانحراف المفترض $\alpha = 0.25$ (MDIC) والتي اعتمدت لتحديد رتبة انموذج الانحدار الذاتي للسلسلة المولدة من انموذج رقم (4)، وعندما يكون توزيع حد الخطأ يتبع $N \sim (0, 2)$.

n=60	Lag 1	Lag2	Lag 3	Lag 4	Lag5	Lag 6	Lag 7	Lag 8
AIC	8.4401	0.9978	0.9850	0.7284	0.7467	0.7553	0.7634	0.7714
SIC	508.5	64.054	65.385	52.082	55.276	57.885	60.466	63.04
HQ(c=3)	508.64	64.323	65.788	52.62	55.948	58.692	61.407	64.116
FPE	8147.1	2.79	2.7668	2.1201	2.1508	2.1793	2.1926	2.2191
MDIC	- 0.4883	- 50.881	- 50.535	- 57.021	- 54.872	- 52.349	- 49.314	- 45.379
n=80								
AIC	11.531	0.9718	0.9959	0.7231	0.7488	0.7388	0.7603	0.7761
SIC	924.86	82.511	86.814	67.373	71.816	73.396	77.497	81.146
HQ(c=3)	924.91	82.612	86.966	67.575	72.068	73.699	77.85	81.551
FPE	1.9055 e+005	2.7063	2.7664	2.0892	2.1403	2.124	2.1712	2.2098
MDIC	0.80892	- 69.1	- 67.318	- 76.737	- 74.06	- 72.23	- 68.474	- 64.032
n=150								
AIC	22.858	0.9897	0.9795	0.7076	0.7166	0.7245	0.7329	0.7358
SIC	3431.7	154.47	155.96	118.19	122.54	126.74	131.01	134.45
HQ(c=3)	3431.5	154.12	155.43	117.48	121.66	125.68	129.78	133.05
FPE	1.5009 e+010	2.7234	2.6914	2.0438	2.0633	2.0788	2.097	2.1028
MDIC	1.3846	- 128.5	- 128.34	- 146.61	- 144.23	- 141.39	- 137.68	- 133.81
n=250								
AIC	39.275	0.9835	0.9798	0.6966	0.7072	0.7184	0.7160	0.7217
SIC	9822.2	252.91	255.5	188.23	194.41	200.72	203.65	208.6
HQ(c=3)	9821.8	252.12	254.32	186.65	192.43	198.35	200.88	205.44
FPE	2.0101 e+017	2.6906	2.6816	2.015	2.0377	2.0595	2.0553	2.0669
MDIC	1.3884	- 215.13	- 214.65	- 247.2	- 243.85	- 240.41	- 237.56	- 233.14
n=500								
AIC	81.04	9.2708	9.8272	9.7172	9.8153	9.7533	9.7161	9.7256
SIC	40524	4643.8	4926.3	4875.4	4928.7	4901.9	4887.5	4896.5
HQ(c=3)	40524	4642.3	4924.1	4872.5	4925.1	4897.5	4882.4	4890.6
FPE	2.7763 e+035	28738	55243	53065	53763	50151	49019	48094
MDIC	1.3884	- 10.531	- 5.452	- 3.8135	0.39527	2.7549	8.4995	12.903



6. الاستنتاجات

تناولنا في هذا البحث المقارنة بين معايير المعلومات المستخدمة لتحديد رتبة أنموذج الانحدار الذاتي للعملية التي ولدت منه البيانات، ودراسة تأثير توزيع حد الخطأ (e_t) المفترض، عندما تكون $e_t \sim N(0,1)$ على اداء المعايير المستخدمة في المقارنة وكل حجوم العينات ($n=60,80,150,250,500$) قيد البحث. ومن النتائج المبينة في الجداول في الجانب التجريبي، تبين بان معيار MDIC قد تفوق على بقية المعايير في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج الذي ولدت منه البيانات ثم يليه معيار AIC ومعيار FPE بالحالات التي يكون فيها توزيع حد الخطأ للسلسلة الزمنية الذي ولدت منه البيانات يتبع التوزيع $N(0,2)$ ، ولاغلب حجوم العينات قيد البحث. فضلا عن ذلك فقد تم الحصول على نتائج متماثلة تقريباً لقيم المعايير التي تحدد الرتبة المطابقة لأنموذج الذي ولدت منه البيانات، عندما تكون $e_t \sim N(0,1)$. في حين نلاحظ فشل كل المعايير المستخدمة في البحث لتحديد الرتبة لأندونجين رقم (3,2) الذين ولدت منهم البيانات وكل قيمة n المفترضة وعندما تكون $e_t \sim N(1,1)$ ، وفي غرامة تقدم نستنتج الآتي :

- يمكن اعتماد معيار MDIC لقيم $\alpha = [0.2 - 0.9]$ في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج رقم (1)، عندما تكون $e_t \sim N(0,1)$ ، وتتفاوت امكانية اعتماده بزيادة قيمة α ، لحجم العينة $n=60$.
- يمكن اعتماد معيار MDIC لقيم $\alpha = [0.2 - 0.5]$ في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج رقم (1,4)، عندما تكون $e_t \sim N(0,1)$ ، في حين حدد هذا المعيار الرتبة المطابقة لأندونجين رقم (2,3)، عند القيمة $\alpha = 0.3$ لحجم العينة $n=150$.
- يعد معيار MDIC المعيار الوحيد (الأفضل) الذي حدد الرتبة المطابقة لأندونجين رقم (1,2) الذين ولدت منها البيانات عندما تكون $e_t \sim N(0,2)$ ، لحجم العينة $n=250$.
- عندما تكون $e_t \sim N(0,2)$ ، يمكن اعتماد معيار MDIC في الحجوم الكبيرة من العينات ($n=150,250,500$) في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج رقم (2) الذي ولدت منه البيانات.
- عندما تكون $e_t \sim N(0,2)$ ، فإن افضل أداء كان لمعيار MDIC ثم يليه معيار AIC ومعيار FPE في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج رقم (3) الذي ولدت منه البيانات، لحجم العينة $n=500$.
- عندما تكون $e_t \sim N(0,1)$ و $e_t \sim N(0,2)$ ، فإن افضل أداء كان للمعيارين SIC و HQ في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج رقم (4) الذي ولدت منه البيانات، لحجم العينة $n=500$.
- عندما تكون $e_t \sim N(1,1)$ ، فإن افضل أداء كان للمعيارين SIC و HQ في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج رقم (1) الذي ولدت منه البيانات، لحجوم العينات $n=60,80,150$.
- عندما يكون $e_t \sim N(1,1)$ ، فإن افضل أداء كان للمعيارين SIC و HQ في تحديد الرتبة المطابقة لأنموذج رقم (4) الذي ولدت منه البيانات، لحجم العينة $n=150$.




References

1. Basu, A., Harris, I. R., Hjort, N. L., and Jones, M. C. (1998). " Robust and efficient estimation by minimising a density power divergence". *Biometrika*, 85 (3), 549–559. MR1665873.
2. Karagrigoriou, A. & Vonta, F. (1999). " Asymptotically efficient order Selection of a nonzero mean AR process for h-step prediction ". *The Indian Journal of Statistics, Volume 61, Series A, Pt. 3*, pp. 381-397.
3. Karagrigoriou ,A. & Papaioannou ,T., (2008), "On Measures of Information And Divergence and Model Selection Criteria ". Ellibs. Com – Ellibs Bookstore spring.
4. Karagrigoriou, A. &Mattheou, K. &, Mantalos, P., (2008). , "Using the Divergence Information Criterion for the Determination of the Order of an Autoregressive Process". (By internet), Mas. Ucy. Ac.cy/English/ Technical - Reports.
5. Karagrigoriou, A. & Mattheou, K. (2007)."Recent Advances on Measures of Divergence". XIIth Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference.
6. Karagrigoriou, A., Mattheou, K., & Lee, S., (2008). A model selection Criterion based on the BHHJ measure of divergence, *J. of Statist. Plann. Inf.* (To appear).
7. Konishi ,S.& Kitagawa ,G.,(1996)," Generalised information Criteria in Model selection", *Biometrika* 83(4):875-890.
8. Liew, Venus Khim-Sen (2004). Which Lag Length Selection Criteria Should We Employ? *Economics Bulletin*, 3(33), 1-9.
9. Sergio F. Ju'arez1 and William R. Schucany (2006),"A note on the Asymptotic distribution of the minimum density power divergence Estimator ", *IMS Lecture Notes-Monograph Series*, 2nd Lehmann Symposium- Optimality, Vol. 49, pp. 334–339.
10. Wei, w.w.s. (1990), *Time series Analysis: Univariate and Multivariate methods*, Addison- wesly publishing –Inc., U.S.A.



الملحق

. AR(1) لـ (AIC, FPE, HQ, SIC, MDIC) خوارزمية مبسطة لحساب قيم معايير المعلومات



ملاحظة : يتم تكرار الخوارزمية اعلاه لكل نموذج المتبقية ووفقاً لمعلمات نموذج AR(p) ، وللمعلمات توزيع حد الخطأ.